5948

NOVA GENERA & SPECIES PLANTARUM.

RH
QK2
.S8
.178

NOVA GENERA & SPECIES PLANTARUM

SEU

PRODROMUS

DESCRIPTIONUM VEGETABILIUM,

MAXIMAM PARTEM INCOGNITORUM

QUÆ

SUB ITINERE IN INDIAM OCCIDENTALEM

ANNIS 1783—87

DIGESSIT

OLOF SWARTZ. M. D.

Mo. Bot. Garden.

Uechtritz

HOLMIÆ, UPSALIÆ, & ABOÆ,

In Bibliopoliis Acad. M. SWEDERI.

MDCCLXXXVIII.

1788

Many shall run to and fro, and Knowledge shall be increased.

DAN. XII.

PRAEFATIO.

INDIA occidentalis, ſive Inſulæ ſic dictæ Antillicæ, non minus qvam reliquæ inter Tropicos ſitæ regiones, inſignem admodum Vegetabilium ferunt proventum. Qvorum ingens omnino numerus, diligentisſima multorum diverſis temporibus facta perqviſitione, dudum eſt inveſtigatus. Sed & ſic plurima reſtare tamen futuris Naturæ ſcrutatoribus reſervata, fatebuntur periti rerum exiſtimatores; licet trecenti prope efluxerint jam anni, ex quo novum detexerunt Europæi orbem.

ILLOS inter, qui enodandæ harum regionum Hiſtoriæ naturali laudabili niſu operam ſuam conſecrare voluerunt, commemorandi ſunt præcipue ROCHEFORT, LABAT, THEVETUS, LINOCIER, PLUMIER & SLOANE.

FACERE non posſumus, qvin magnopere admiremur ſtupendam illam adcurationem, ſollertiam & ſagacitatem in cunctis, quæ Pater PLUMIER elucubravit, operibus conſpicuam. Quibus profecto haud poterit carere, qui Naturæ, in hiſce orbis tractibus, theſauros felici cum ſuccesſu indagare ſibi propoſuerit. Celebris hujus Auctoris *Filices*, *plantæ Americanæ* & *Icones per beat. Burmannum editæ*, 900 prope continent Vegetabilium Figuras, quæ prius tantum non omnia fuerunt incognita; ingentem illam ut ſilentio prætereamus Botanicarum multitudinem figurarum, quæ publicam lucem nunqvam adſpexerunt.

Indefesso ſtudio, jam ſua dudum ætate conatus eſt Cel. Sloane ea colligere omnia, quæ ad Hiſtoriam naturalem Jamaicæ amplificandam pertinerent. Luculentum ſatis huic rei perhibet teſtimonium Itineris, qvod ad hanc Inſulam inſtituerat, deſcriptio, *) figuras 546 exhibens. Quæ, utut minoris magna ex parte momenti, honorabilem tamen Auctori inter *Fundatores* Botanicos **) vindicant locum.

Eum poſteriori tempore excepit Cel. Browne in exploranda Naturali hujus Inſulæ Hiſtoria. Cui rei etiam omnem, qvem poterat, impendit laborem & induſtriam. In ſyſtematicum ordinem cuncta diſpeſcuit, inventarum ſimul a ſe Plantarum egregias addens figuras, eo majori in pretio habendas, qvod eas artificioſisſimis Incliti illius Ehreti manibus æri incidendas curaverat. Aſt horum obſervationes Duumvirorum ad Jamaicam ſolam inprimis ſpectabant, quæ non niſi exiguam conſtituit Archipelagi Indiæ occidentalis portionem.

Quæ antea peragraverat Cel. Plumier loca, eorum plurima deinde inviſit celebratisſimus Ille Jacquin. Qvi qvo ingenuo mentis ardore adamatæ a ſe Scientiæ auctibus provehendis invigilaverit, indicio esſe potuerunt, *Enumeratio Plantarum Americanarum*, *Selectarum ſtirpium Americanarum Hiſtoria*, *Obſervationes Botanicæ*, & q. ſ. r.

Ab hac mundi parte & ex his oris, ego quoque haud ita pridem redii, non exiguis Floræ divitiis onu-

*) Voyage to Jamaica etc. 1707.
**) Linn. phil. bot.

nuſtus. De eo lætus, quod licuerit mihi præſtantium adeo Scientiæ Naturalis cultorum fidis inſiſtere veſtigiis, multa ab iis relicta colligere, & perfectius luſtrare, quæ illis adcurate examinandi defuit occaſio, propero jam Orbi Botanico exponere fructum jucundi mihi plus ſimplici laboris. Qvinque omnino præterlapſi ſunt anni, ex quo in Floræ, tropicos inter habitantis adyta intromitti mihi dabatur. Inſulæ Antillicæ diverſo, una poſt alteram, tempore a me freqventabantur, Jamaica, Cuba, Hiſpaniola: quarum tamen iſta maximam mihi videbatur mereri animi attentionem.

Est enim hæc ipſa Inſula, ubi plurimum temporis ſub hac mea profectione exegi, cujusque interiores quoque regiones montanis in tractibus ſitas penetravi, immo ea luſtravi loca, qvæ aditu non modo perqvam difficilia ſed et prorſus invia exiſtimata fuerunt. Hiſce in locis plures longe eosque diverſos Naturæ fetus cognoſcere mihi licuit, qvam viderant Antecesſores mei, & ut in temperato magis Climate, minusque adeo torrentibus ſolis caloribus expoſitus, aliqua cum commoditate inqviſitiones meas perſeqvi potui; ſæpe etiam jucunda quorundam Anglorum, ibi verſantium ſocietate ſtipatus, quibus innoteſcendi propenſaque illorum mihi comparandi ſtudia, qvod occaſio ſeſe obtulerit, id vero gratum mihi & opportunum accidit.

Insigni, poſt brevem adeo in illis plagis commorationem, collectione prope 850 novarum ſpecierum Vegetabilium ditatus, Angliam repetebam A:o. 1786. Magna hujus collectionis pars adcuratius jam digerebatur, dum liber mihi pateret aditus ad præclarum

rum Museum Ill. JOSEPHI BANKS Baroneti, Societatis Regiæ Anglicanæ Præsidis, qvi nec ipse suam mihi denegabat benevolentiam, qvin suis me consiliis, sua inspectione juvare dignaretur. Non poterunt immortales Perillustris hujus Viri digne satis celebrari laudes. Perspecta jam dudum habet Litteratus Orbis maxima Illius promerita, incredibile in Scientiam Naturalem penitus sibi dilectam studium, animumque illum generosum, quo Scientiarum complectitur Cultores. Satis sit dixisse, Orbi sero adpariturum, qvi Illi par inveniatur. Indulgenti Illius permissu, dum Londini versabar, auctæ sunt Collectiones meæ, atque in eum accreverunt numerum, qvem præsens hic sistit Prodromus. Constant hæ accessiones Vegetabilibus, quæ ex diversis locis Indiæ Occidentalis jam antea Angliam fuerant transmissa, ibique statim a def. Doct SOLANDRO descripta, & eorum exempla in Museum illata. Horum in censu, unum quoque et alterum novum plane occurrit Genus, quorum suo quodque loco asterisco (*) notandum duxi.

NEQUE intermittere fas mihi fuerit, qvin grata commemoratione profitear, Popularem meum honoratissimum, Phil. Mag. JON. DRYANDER, Bibliothecæ Soc. Reg. Lond. Præfectum, cujus excellens in Botanicis scientiis ceterisque Historiæ Nat. partibus cognitio est notissima, haud parum mihi adtulisse adjumenti in perlustrandis Vegetabilibus Musei Banksiani

QUÆ ut nova a me edita sunt Vegetabilia, ea certius etiam ab omnibus aliis fuerunt distincta, idque eo exactius, quod ansa mihi suppeditabatur illa cum reliquiis Linnæanis comparandi, quas postquam Svecia perdidit, eo intentiori cura servat Anglia.

Ad excludendas Clasſes *Monoeciæ Diæciæ* & *Polygamiæ*, tam exemplo Cel. Prof. & Eqvit. Thunberg, quam mea ipſius experientia impulſus ſum. Qvum in calidioribus commorarer Zonis, magis ſenſim magisque mihi conſtare cœpit, Arborum plerasque eſſe Polygamas, & multas Hermaphroditarum Linnei ſæpe floribus Maſculinis & Femineis ſeorſum gaudere. Quæ omnia ſatis oſtendunt reductionem harum Clasſium fieri non poſſe modo, ſed & oportere. Quod ad *Gynandriam* attinet, retinendas judicavi præſertim *Orchideas* utpote quæ Clasſem æque profecto diſtinctam efficere videntur, ac *Didynamæ Tetradynamæ* & *Monadelpha*. Multiplex & varius, quem flores earum præ ſe ferunt, habitus, adhuc qvidem Genera totius hujus Clasſis valde reddidit incerta & vaga; ſed ſperandum fuerit, detectis poſthac pluribus ſpeciebus, fore ut ea facilius, certiusque explicari queant.

Pluribus in locis Syſtemati conveniens inveni, & causſas ſufficientes mihi fuisſe exiſtimavi, cur unum alterumque reducerem Genus ex Americanis, quæ olim in Generibus plantarum determinaverat Linneus, poſtquam mihi licuit adcuratius illa contemplari, eorumque cum cognatis comparationem inſtituere. Pari ratione etiam neceſſarium interdum duxi diſtincta determinare Genera ex quibusdam ſpeciebus cognitorum antea Generum, quum plures offendi, quæ cum illis conveniunt.

Pauca aliorum Auctorum, e. g. Jacqvini, Browne i, Aubleti &c. nova genera necdum Syſtemati Vegetabilium inſerta, de integro determinavi, & in ſuum quodque locum digesſi; poſtquam adcurate perluſtrata

ta

ta fuerunt & deſcripta. Horum cuique nomen illius appoſui, qui ea primus detexiſſe videatur.

HUNC itaque libellum eſſe volui *Prodromum futuri Operis*, quod integras continebit Deſcriptiones harum ſpecierum, quæque in publicum prodibunt, qvam primum figuræ, qvibus illuſtrari debent, fuerint perfectæ.

PRIUS vero Amatoribus ſcientiæ me traditurum ſpero Characteres Naturales eorum Generum, quæ tanqvam nova hic adducta conſpiciuntur; ut et factas meo ſub itinere obſervationes Botanicas. Hoc interim, quod jam exhibetur, ſpecimen inſervire poterit ſupplementi loco Editionis poſtremæ Syſtematis Vegetabilium.

NO-

NOVA GENERA.

CHARACTERES GENERUM ESSENTIALES.

I. BROSIMUM. (MONANDRIA *Monogynia.*)

Dioic. ♂. *Amentum* globoſum undique tectum ſqvamis peltatis. *Cal.* O. *Cor.* O. *Antheræ* bilamellatæ.

♀. *Amentum* maris. *Stylus* unicus, 2-fidus. *Drupa* 1-ſperma.

II. LACISTEMA. (MONANDRIA *Digynia.* ante *Coriſpermum.*)

Amentum. *Cor.* 4-partita. *Filamentum* bifidum.

III. LITHOPHILA. (DIANDRIA *Monogynia.* *Flores inferi tripetali.*)

Cal. triphyllus. *Cor.* tripetala. *Nectarium* diphyllum.

IV. THOUINIA. (DIANDRIA *Monogynia.* *Flores inferi 4-petali.*)

Cal. 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Antheræ* ſeſſiles.

V. XIPHIDIUM. * (TRIANDRIA *monogynia.* *inter Wachendorf. & Commelinam.*)

Cor. 6-petala, æqvalis. *Cal.* O.

VI. SCLERIA. (TRIANDRIA *Monogynia.* pone *Schœnum.*)

Monoic. ♂. *Spiculæ* multifloræ.

♀. *Spiculæ* unifloræ. *Semen* ſuboſſeum, globoſum.

VII. LEERSIA. (TRIANDRIA *Monogynia.* *poſt Saccharum.*)

Cal. O. *Cor.* bivalvis, clauſa.

VIII. CHLORIS. (TRIANDRIA *Monogynia.* ante *Airam.*)

Polygam. *Cal.* communis bivalvis, biflorus, floſculo *Hermaphrodito* ſeſſili, altero *maſculo* pedicellato.

IX. PICRAMNIA. (TRIANDRIA *Digynia.* *pone Ofiridem.*)

Dioic. ♂ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* tripetala.
☿ *Cal.* & *Cor.* maris.
Bacca 2-locularis.

X. ERNODEA. (TETRANDRIA *Monogynia.* inter *Ixoram* & *Petefiam.*)

Cor. hypocrateriformis. *Cal.* 4-dentatus.
Bacca 2-locularis. *Sem.* folitaria.

XI. HOFFMANNIA. (TETRANDRIA *Monogynia* poft *Petefiam.*)

Cor. hypocrateriformis, 4-partita.
Cal. 4-dentatus. *Filam.* O.
Bacca bilocularis, polyfperma.

XII. COCCOSIPSILUM. (TETRANDRIA *Monogynia.* ante *Hedyotidem.*)

Cor. infundibuliformis. *Cal.* 4-part.
Bacca inflata 2-locularis, polyfperma.

XIII. WALLENIA. (TETRANDRIA *Monogynia.* ante *Callicarpam.*)

Cor. tubulofa. *Cal.* 4-fidus.
Bacca 1-fperma.

XIV. LABATIA. (TETRANDRIA *Monogynia.* inter *Pæneam* & *Blæriam.*)

Cor. fubcampanulata. *Cal.* 4-phyllus.
Capfula 4-locularis. *Sem.* folitaria.

XV. BOEHMERIA. (TETRANDRIA *Monogynia.* *Fl. incompl. inferi.*)

Monoic. ♂. *Cal.* 4. partitus.
☿. *Cal.* O. *Stylus* 1.
Sem. 1.

XVI. SCHEFFERIA. (TETRANDRIA *Digynia.*)

Dioic. ♂. *Cor.* 4-petala l. nulla.
Cal. 4-5 phyllus.
♀. *Cor.* 4 petala l. nulla.
Cal. 4—5 partitus.
Bacca 2-locularis.

XVII. CRANTZIA. (TETRANDRIA *Trigynia.*)
Monoic. ♂. *Cor.* O. *Cal.* 4-phyllus.
♀. *Cor.* O. *Cal.* 5-phyllus.
Caps. 3-cornis, 3-locularis.

XVIII. ARGYTHAMNIA. (TETRANDRIA *Trigynia.* pone *Ciccam.*)
♂. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyll.
Monoic. ♀. *Cor.* O. *Cal.* 5-phyllus.
Styli dichotomi. *Caps.* 3-cocca.

XIX. BUMELIA. (PENTANDRIA *Monogynia.* inter *Jaquiniam* & *Laugeriam.*)
Drupa 1-sperma. *Cor.* 5-fida.
nectario 5-phyllo.

XX. ARDISIA. (PENTANDRIA *Monogynia.* ante *Varroniam.*)
Drupa monosperma. *Cor.* reflexa.
Stigma simplex.

XXI. SOLANDRA. (PENTANDRIA *Monogynia.* inter *Lycium* & *Menaiu.*)
Bacca 4-locularis, polysperma.
Calyx rumpens. *Cor.* maxima.

XXII. CEPHAELIS. (PENTANDRIA *Monogynia.* inter *Morindam* & *Psychotriam.*)
Bacca 2-sperma. *Cor.* tubulosa.
Receptaculum paleaceum.

XXIII. SABICEA. (PENTANDRIA *Monogynia.* inter *Hameliam* & *Erithaliem.*)
Bacca 5-locularis, polysperma.
Cor. infundibulif. *Stigma* 5-part.
Involucrum 4-fidum.

XXIV. RUYSCHIA* (PENTANDRIA *Monogynia.* pone *Vitm.*)
Fructus polyspermus. *Cor.* reflexa.
Stylus O. *Cal.* 5-phyllus.

XXV. DICHONDRA. (PENTANDRIA *Digynia.* pone *Hydroleam.*)
Caps. 2 monospermæ.
Cor. rotata, 5-partita.

XXVI. ROCHEFORTIA. (PENTANDRIA *Digynia.* inter *Schreberam* & *Steridem.*)
Fructus bilocularis, polyspermus. *Cor.* infundibuliformis, fauce aperta.

XXVII. MICROTEA.* (PENTANDRIA *Digynia.* ante *Salsolam.*)
Semen unicum subglobosum, cortice coriaceo echinato tectum. *Cal.* 5-phyllus, patens.

XXVIII. HEPETIS.* (HEXANDRIA *Monogynia.* pone *Tillandsiam.*)
Cor. 3-petala. *Cal.* 3-partitus. *Caps.* semisupera. *Sem.* mutica.

XXIX. THRINAX. (HEXANDRIA *Monogynia.* *Flores incompleti.*)
Cal. 6-dentatus.
Stigma emarginatum.
Bacca 1-sperma, nuda.

XXX. HEDWIGIA. (OCTANDRIA *Monogynia.* pone *Amyridem.*)
Cor. 4-fida. *Cal.* 4-dentatus.
Capf. 3-locularis.

XXXI. HYPELATE. (OCTANDRIA *Monogynia.* pone *Melicoccam.*)
Polyg. ☿. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Drupa* 1-sperma. *Stigma* deflexum.
♂. ut in *Hermaphrodito.*

XXXII. VALENTINIA. (OCTANDRIA *Monogynia.* post *Dodonæam.*)
Cal. 5-partitus, coloratus, patens.
Caps. baccata, 4-sperma, pulposa.

XXXIII. PETALOMA. (DECANDRIA *Monogynia.* pone *Murrayam.*)
Petala 5 calyci inserta.
Cal. cyathiformis.
Bacca 1-locularis.

XXXIV. CALYPTRANTHES. (ICOSANDRIA *Monogynia.* post *Myrtum.*)

Cal. truncatus, operculatus.
Cor. O. *Bacca* 1-4-sperma.

XXXV. POSSIRA. (POLYANDRIA *Monogynia.* post *Marcgraviam.*)

Cal. 4-phyllus (partitus).
Petalum unicum, laterale, ungviculatum.
Legumen 1-loc. 2-valve.

XXXVI. APEIBA.* (POLYANDRIA *Monogynia.* inter *Cistum* & *Corchorum.*)

Caps. multilocularis, echinata: *loculis* polyspermis.
Cal. 5-phyllus.

XXXVII. MARILA.* (POLYANDRIA *Monogynia.* inter *Cistum* & *Corchorum.*)

Caps. 4-locularis. *Cal.* 5-phyllus.
Stigma simplex.

XXXVIII. EROTEUM (POLYANDRIA *Monogynia.* inter *Tiliam* & *Muntingiam.*)

Bacca exsucca, 3 loc. polysperma.
Cal. 5-phyllus. *Stylus* 3-fidus.

XXXIX. LEGNOTIS. (POLYANDRIA *Monogynia.* inter *Muntingiam* & *Elæocarpum.*)

Caps. 3-locularis. *Petala* receptaculo inserta, lacera.

XL. LIGHTFOOTIA. (POLYANDRIA *Monogynia.* ante *Laetiam.*)

Polygam. ☿. *Cal.* 4-phyllus. *Stigma* sessile.
Bacca umbilicata, 3-6-sperma.
♂-♀-hermaphroditi.

XLI. HEDYOSMUM. (POLYANDRIA *Monogynia.* *Apetali.*)

Monoic. ♂. *Amentum* antheris sessilibus tectum.
♀. *Cal.* 3-dentatus, superus.
Stylus triqueter. *Bacca* 3-gona, 1-sperma.

XLII. ACIDOTON. (POLYANDRIA *Monogynia.* *Apetali.*)

Dioic. ♂. *Cal.* 5-phyllus.
Monoic. *Stam.* receptaculo globoſo affixa.
♀. *Cal.* 6-phyllus. *Stylus* 3-fidus.
Caps. tricocca.

XLIII. HOMALIUM. (POLYANDRIA *Trigynia.* ante *Delphinium.*)

Cal. 6-7-partitus. *Pet.* 7.
Stam. 21. per 3 aggregata.

XLIV. TANÆCIUM. (DIDYNAMIA *Angioſpermia* ante *Cal.* 2-fidos.)

Bacca corticoſa, maxima.
Cor. tubuloſa, ſubæqvalis, 5-fida.
Rudimentum fil. 5-ti.

XLV. TAMONEA. (DIDYNAMIA *Angioſpermia.* pone *Pedalium.*)

Nux. 4-locularis. *Cal.* ariſtatus.

XLVI. GYMNANTHES. (MONADELPHIA *Triandria.* pone *Iuniperum.*)

Monoic. ♂. *Amentum* nudum.
Dioic. *Stam.* pedicelli 3-partiti l. 3-chotomi, antheriferi.
♀. *Amentum* l. *Germen* pedicellatum.
Stylus 3-fidus. *Caps.* 3-cocca.

XLVII. MYRISTICA. (MONADELPHIA *Triandria.*)

Dioic. ♂. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* O.
Filamentum columnare.
♀. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* O.
Caps. drupacea, 2-valvis.

XLVIII. OCHROMA. (MONADELPHIA *Petnandria.* pone *Melochiam.*)

1-gyna. *Caps.* 5-locularis.
Cal. 2-plex. *Antheræ* anfractuoſæ, connatæ.

XLIX. ALCHORNEA.* (MONADELPHIA *Octandria.*)

Dioic. ♂. *Cal.* 3-5-phyllus. *Cor.* O.
♀. *Cal.* 5-dentatus *Cor.* O.
Stylus 2-partitus.
Capſula dicocca.

ACHA-

L. ACHANIA. * (MONADELPHIA *Polyandria.* inter *Hibiscum* & *Althæam.*)
Monogyna. *Cal.* exter. polyphyllus. *Bacca* 5-sperma.

LI. MYRODIA. * (MONADELPHIA *Polyandria.* ante *Mesuam.*)
Monogyna. *Cal.* simplex, 1-phyllus. *Petala* 5.
Drupa sicca, 2-sperma.

LII. AMERIMNON. (DIADELPHIA *Decandria.* pone *Pterocarpum.*)
Legumen compresso-foliaceum, 2-valve, dehiscens.
Cal. bilabiatus.

LIII. TERAMNUS. (DIADELPHIA *Decandria.* pone *Amorpham.*)
Carina minima, calyce recondita.
Stamina alterna, 5-sterilia.

LIV. STYLOSANTHES. (DIADELPHIA *Decandria.* pone *Æschynomenen.*)
Legumen 2-articulatum, hamatum.
Calyx tubulatus, longissimus, corollifer.

LV. LAVENIA.* (SYNGENESIA *Pol. æqualis.* inter *Spilanthum* & *Ageratum.*)
Rec. nudum. *Pappus* 3-aristatus glandulosus.
Cal. subæqvalis.

LVI. TRIXIS. (SYNGENESIA *Pol. necessaria* pone *Polymniam.*)
Rec. paleaceum. *Pappus* nullus. *Sem.* apice villosa.
Corollulæ radii 3-fidæ.

LVII. TETRANTHUS. (SYNGENESIA *Pol. segregata.* post *Echinopen.*)
Cal. communis 4-florus. *Perianth.* 1-phyllum.
Sem. coronata.
Polygamia æqualis.

RO-

LVIII. ROLANDRA. (Syngenesia *Pol. ſegregata.* poſt *Echinopen*)
Capitata. Perianth. 2-valve, uniflorum.
Pappus nullus.
Polygamia æqualis.

LIX. MALAXIS. (Gynandria *Diandria.* pone *Ophrydem.*)
Nectarium 1-phyllum, concavum, cordatum, *genitalia* in medio fovens.

LX. CRANICHIS. (Gynandria *Diandria.* poſt *Arethuſam.*)
Nectarium galeatum.

LXI. MARATTIA. (Cryptogamia *Filices.* *Fructif. frondoſæ* ante *Acroſtichum.*)
Capſulæ (fructificat.) multiloculares. *Loculis* ſuperne dehiſcentibus.

NOVÆ
SPECIES.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

AMOMUM.

Sylueſtre. 2—3. A. ſcapo nudo, ſpica elongata bracteis oblongis ventricoſis, foliis lato-lanceolatis. *Sloan. jam.* 61. *hiſt.* I *p.* 165. *t.* 105. *f.* 2. Amomum 2. *Brown. jam.* 113. *Jamaica.* ♃.

COSTUS.

glabratus. 2. C. foliis utrinque glabris, ſpica pauciflora, ſquamis apice foliaceis, ſummis faſtigiatis. * *Coſtus Linn. H. Cliff.* 2. *deſcr.* Planta. *Mer. Sur. t.* 36. *India occidentalis.* ♃

ſpicatus. 3. C. foliis utrinque glabris, ſpica multiflora ſubouata, arcte imbricata: ſquamis ouatis ſimplicibus. Alpinia ſpicata. *Murr. S. V. p.* 51. 2. *Jacqu. am.* 11. *t.* 1. *Inſulae caribaeae.* ♃.

arabicus. 1. C. *foliis ſubtus ſericeis.* C. *arabicus Linn.*

ALPINIA.

Occidentalis. 2. A. racemo radicali compoſito erecto, nectario apice emarginato, capſulis trilocularibus, foliis lanceolato ouatis glaberrimis. *Jamaica, Domingo, &c.* ♃.

racemoſa. 1. A. *racemo terminali ſpicato, floribus alternis, nectarii labio trifido; foliis oblongis acuminatis.* A. *racemoſa Linn.*

CYN-

CYNOMORIUM.

Jamaicense 2. C. ſtipite ſquamoſo, amento elongato, ſquamis imbricatis dimidiatis rhomboideis. Cynomorium. *Brown. jam.* 334.
Jamaica, paraſitica.

Cayanenſe. 3. C. ſtipite nudo, amento ſubgloboſo, ſquamis ſubrotundis peltatis. *
Cayenna, paraſitica.

BROSIMUM.

DIOIC. ♂. *Cal. Amentum* globoſum, undique tectum ſqvamis orbiculatis peltatis.
Cor. O.
Filamenta ſolitaria inter ſquamas erumpentia.
♀. *Cal.. Amentum* maris.
Cor. O. *Stylus* unicus, bifidus.
Bacca monoſperma.

Alicaſtrum 1. B. foliis ouato-lanceolatis perennantibus, amentis globoſis pedicellatis ſolitariis axillaribus, fructu corticoſo. *Alicaſtrum Brown. jam.* 372.

Spurium. 2. B. foliis lanceolato-ovatis, acuminatis, amentis pedicellatis ovatis axillaribus geminis, fructu molli. *Arbor* foliis oblongis glabris alternis. *Brown. jam.* 369. 8.
Jamaica. ♄

DIGYNIA.

LACISTEMA.

Cal. Amenti ſquama *Cor.* quadripartita.
Filamentum bifidum.
Bacca pedicellata, monoſperma.
(ante *Coriſpermum.*)

Myricoides LACISTEMA.
Piper aggregatum. *Berg. Act. Helv.* 7. p. 131. t. x.
Jamaica.

CLAS-

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

CHIONANTHUS.

compacta. 1–2. C. paniculis trichotomis, ultimis floribus subcapitatis, calycibus villosis, foliis lanceolato-oblongis; antheris acuminatis. *
Insulæ caribææ ♄.

incrassata. 1–2. C. ? paniculis ramis decussatis fastigiatisve, ultimis 3-floris, corollis tetragonis, laciniis erectis incrassatis, foliis oblongis consistentibus.
Iamaica. ♄.

IUSTICIA.

nitida. 6–7. I. fruticosa, foliis ellipticis acuminatis, racemis spicæ-formibus verticillatis, bracteis minutis, pedicellis calycibusque glabris. (antheris *paralellis*) * Justicia nitida *Jacq. am.* 5. *Insulæ caribææ.* ♄.

armata. 8–9. I. fruticosa, aculeata, foliis oblongis emarginatis coriaceis nitidis.
Jamaica. ♄.

acicularis. 8–9. I. fruticosa, diffusa, spinosa, spinis setaceis, floribus pedunculatis axillaribus solitariis.
Jamaica ♄.

pectoralis. 18–19. I. (*Dianthera* L.) caule herbaceo adscendente, foliis lanceolato-linearibus, spicis terminalibus subpaniculatis.
J. pectoralis. *Jacq. am.* 3. *Tab.* 3.
Dianthera 3. *Brown. jam.* 118. 3.
India occidentalis ♃.

reptans 18–19. I. (*Dianthera* L.) caule herbaceo repente foliis obtusis, spica terminali indiviso.
Domingo. ☉.

humi-

humifuſa. 18–19. I. (*Dianthera.* L.) caule herbaceo decumbente foliis ovatis cordatisque, ſpicis umbellatis.
Jamaica. ⊙.

nemoroſa. 21–22. I. caule herbaceo tetragono erectiusculo, foliis ouato-lanceolatis, ſpicis ovatis.
Jamaica, Hiſpaniola. ♃.

GRATIOLA.

repens. 2–3. G. foliis ouatis, caule repente, calyce 5-phyllo, ſtylo bifido.
Jamaica.

UTRICULARIA.

obtuſa. 4–5. U. nectario inflexo obtuſo ſubemarginato.
Utricularia 1. *Brown. jam.* 119.
Jamaica.

SALVIA.

occidentalis. 6–7. S. foliis ouatis ſerratis, ſpicis laxis, bracteis cordatis ſubtrifloris.
Salvia 1. *Brown. jam.* 117.
India occidentalis. ♃.

tenella. 7–8. S. foliis cordatis, caule filiformi repenti, ſpicis adſcendentibus.
Jamaica. ⊙.

LITOPHILA.

Cayx triphyllus. *Corolla* tripetala.
Nectarium diphyllum.
(*Flores inferi, tripetali.*)

muſcoides 1. LITHOPHILA.
Navaza.

THOUINIA.

Cal. quadridentatus. *Cor.* quadripetala.
Antherae petala duo oppoſita baſi connectentes.
Bacca bilocularis. *Loc.* 2-ſpermibus.
(*Flores inferi* 4 *petali.*)

ligu-

liguſtrina 2. THOUINIA foliis lanceolatis, paniculis terminalibus, floribus erectis.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

TRIGYNIA.

PIPER.

diſcolor. 3-4. P. foliis lato-ovatis 5-nerviis glaberrimis, poſtice diſcoloribus, ſpicis laxioribus, floſculis remotioribus.
Jamaica. ♄.

macrophyllum. 9-10. P. foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris, petiolis appendiculatis, caule lævi.
Piper 4. *Brown. jam.* 122.
Jamaica. ♄.

geniculatum. 9-10 P. foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris, caule ramisque geniculatis.
Jamaica. ♄.

verrucoſum. 9-10. P. arboreſcens, foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris coriaceis, caule ramisque verrucoſis.
Sloan. cat. 25. *h.* 1. 135.
Piper arboreum. *Aubl. guian.* –
India occidentalis. ♄.

hiſpidum. 9-10. P. foliis ouatis acuminatis obliquis hirſutis rugoſis, nervis alternis, ſpicis erectis.
Jamaica. ♄.

nitidum. 9-10. P. foliis lanceolato-ovatis, baſi obliquis glabris nitidis.
Jamaica. ♄.

alpinum. 10-11. P. herbaceum, caule erecto ſimpliciuſculo, foliis ouato-ſubrotundis acutis, ſubtus aveniis, ſpicis axillaribus.
Jamaica ♃.

hiſpidulum. 10-11. P. herbaceum, erectiuſculum, foliis ſubrotundis petiolatis tenuisſimis, ſuperne hirtis.
Jamaica. ☉.

tenellum. 10–11. P. herbaceum, ſimplex decumbens, foliis diſtichis ouatis aueniis, margine ciliatis, ſpica adſcendenti.
Jamaica ☉.

amplexicaule. 11–12. P. ſubherbaceum, foliis lanceolato-ovatis amplexicaulibus nervoſis carnoſis, caule erecto ſimplici.
India occidentalis ♃.

glabellum. 16–17. P. herbaceum, foliis ouatis acuminatis, caule declinato radicante ramoſisſimo.
Jamaica.

ſcandens. 16–17. P. herbaceum, foliis ouatis acutis, caule radicante ſimplici adſcendenti.
Jamaica.

ſerpens. 12–14. P. herbaceum, foliis ſubrotundo-acutis planis diſcoloribus, caule repente.
Jamaica.

cordifolium. 13.–14 P. herbaceum, foliis obuerſe cordatis petiolatis, plano-convexis carnoſis, caule repente.
Jamaica.

nummularifolium. 13–14. P. herbaceum, foliis orbiculatis convexo-concavis, caule filiformi repente radicante.
Jamaica.

filiforme. 19–20. P. herbaceum, foliis linearibus obtuſis, ſummis verticillatis, caule filiformi repenti.
Jamaica.

ſtellatum. 19–20. P. herbaceum, foliis verticillatis oblongis acuminatis trinerviis glabris, caule erecto.
Jamaica.

CLAS-

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

CAMOCLADIA.

Jlicifolia. 3. C. foliolis angulato-ſpinoſis. *
Jlex dodonæa', *Spec. pl.* 2. 182.
L. Mant. 333. Dodonæa. *Plum. gen.* 20. *ic.* 118. *f.* 1.
India occidentalis, Antigua. ♄.

HIPPOCRATEA.

comoſa. 2. H. paniculis comoſis, pedunculis multifidis capillaribus, foliis ovatis acuminatis integris.
Hiſpaniola. ♄.

volubilis. 1. H. *racemis corymboſis, foliis ovato-lanceolatis ſerratis.* H. volubilis. *Linn.*

XIPHIDIUM.

Calyx nullus.
Corolla 6 petala, æqualis, infera.
Capſula 3-locularis, polyſperma.
(inter *Moræam* & *Wachendorfiam.*)

floribundum. XIPHIDIUM. *
a. *Loefl. it.* 179.
b. *Aubl. Guian. p.* 33. *t.* 11.
Antillæ, St-Chriſtophori. &c. ♃.

SISYRINCHIUM.

latifolium. 3. S. foliis enſiformibus nervoſis, plicatis.
Ixia foliis enſiformibus plicatis glabris caule ramoſo. *Plum. ic.* 35. *t.* 46. *f.* 2.
India occidentalis. ♃.

CAREX.

hamata. 5-6. C. ſpica ſimplici androgyna lineari, ſuperne maſcula, femineis ariſtatis; ariſtis apice uncinatis æqualibus.
Iamaica.

SCLERIA.

MONOIC. MASC. *Cal. Gluma.* 2-6 valvis multiflora mutica.
Cor. Glumæ muticæ. *Fil.* 1-3.
FEM. *Cal. Gluma* 2 6 valvis uniflora mutica. *Stigm.* 1-3.
Semen globoſum, ſuboſseum.
(poſt *Caricem.*)

Flagellum. 1. S. culmo triquetro ſcandente folioſo ſcaberrimo, foliis trifariam retrorſum aculeatis, floribus paniculatis, rachi villoſa.
S. flagellum. *Berg. act. Holm.* 1765. *p.* 144. t. 4.
Carex lithoſperma. *S. V. XIII.*
Schœnus lithoſpermus. *Spec. pl.* 2. *Sloan. h.* I. 118. t. 77. *f.* I.
India occidentalis.

mitis. 2. S. culmo triquetro ſcandente foliisque lævibus, floribus paniculatis, rachi glabra. — *Berg. act. Holm.* 1765. *p.* 145. t. 5.
India occidentalis.

lithosperma. 3. S. culmo triquetro ſcabriuſculo erecto, foliis ſtrictis linearibus margine ſcabris, floribus paniculatis, rachis asperis.
Scirpus lithoſpermus *Sp. pl. I. p.* 51.
Cyperus. *Moriſon. h.* 3. *p.* 237. I. 8. t. 11. *f.* 16.
India occidentalis.

latifolia. 4. S. culmo triquetro, folioſo erecto lævi; foliis lato-lanceolatis nervoſis, floribus paniculatis.
Jamaica.

fili-

filiformis. 5. S. culmo simplici filiformi lævi, foliis subulatis, spica simpliciuscula, flosculis foliolo filiformi subjectis, glabris.
Hispaniola.

hirtella. 6. S. culmo simplici filiformi pubescenti, foliis linearibus, spica simplici, flosculis hirtis.
Jamaica.

SCHOENUS.

stellatus. 8–9. S. culmo sub 3-quetro; spiculis conglomeratis involucro foliaceo, basi colorato.
Sloan. h. 1. 9. 110. t. 78. *f.* 1. *Lamark, Encycl.* 1. 741. *Choin.* 11.
India Occidentalis.

Cladium. 12–13. S. culmo obtuse triquetro folioso lævi, foliis antrorsum aculeatis, paniculis diffusis, spiculis unifloris sessilibus diandris.
Cladium *Brown. jam.* 114.
Iamaica.

effusus. 12–13. S. culmo folioso, obtuse 3-quetro lævi, foliis antrorsum aculeatis, paniculis erectioribus, spiculis 2-floris sessilibus diandris.*
Iamaica.

Restioides. 12–13. S. culmo inferne compresso-ancipitibus, glaberrimis; floribus paniculatis vaginis apice lanceolatis. *
India occidentalis.

Surinamensis. 12–13. S. culmo folioso triquetro, pedunculis corymbosis; inferioribus alternis distantibus, superioribus confertis.
Schœnus surinamensis. *Rotth. gram. n.* 89. t. 21. *f.* 1. *Pluk.amalth. p.* 112.
India occidentalis.

Cyperoides. 11–12. S. culmo triquetro folioso, umbella terminali, spiculis glomeratis.
Iamaica.

gracilis. 13- S. culmo triquetro folioso longissimo filiformi, spicis lateralibus pedunculatis.
Iamaica.

setaceus. 13- S. culmo triquetro subnudo, foliis setaceis, spiculis aggregatis, flosculis diandris.
Jamaica.

pusillus. 13- S. culmo triquetro nudo filiformi, spiculis terminalibus subfasciculatis sessilibus, foliolo subjecto, spicam æquante.
Jamaica.

capillaris. 13- S. culmo triquetro nudo foliisque capillaribus, spiculis fasciculatis reflexis involucratis, involucello diphyllo.
Hispaniola.

CYPERUS.

viscosus. 18-19. C. culmo triquetro nudo, foliis convoluto-teretibus, umbella foliolo decomposita spicis confertis, spiculis compressis ovatis patentibus. Cyperus 11. *Brown. jam.* 129.
Jamaica. ♃.

tenuis. 25-26. C. culmo triquetro nudo, umbella simplici, spiculis subulatis confertis, horizontali-reflexis, foliis involucri lineari-setaceis.
Jamaica.

filiformis. 25-26. C. culmo triquetro nudo filiformi, foliis setaceis, spicis terminalibus-sessilibus confertis tereti-subulatis.
Jamaica.

confertus. 25-26. C. culmo triquetro nudo, umbella simplici foliosa, spiculis ovatis conglomeratis, glumis apice recurvis acuminatis.
Jamaica. ♃.

KYLLINGA.

filiformis. 3-4. K. umbella terminali simplici, spicis sessilibus pedunculatisque ovatis, spiculis ovatis acutis, involucro triphyllo, partiali nullo.
Hispaniola, Jamaica.

OLYRA.

pauciflora. 2. O. floribus axillaribus. Gramen floribus axillaribus, foliis ovatis. *Loefl. it. am.* 243. 100. *Jamaica.*

paniculata. 1. O. *panicula terminali, culmo ramoso.* Olyra latifolia. *Linn.*

DIGYNIA.

SACHARUM.

polystachyon. 2–3. L. floribus paniculatis, spicis filiformibus longissimis fastigiatis, flosculis remotiusculis. * *St. Christopher.*

LEERSIA.

Calyx nullus. *Cor. Gluma* bivalvis, clausa.

(pone *Sacharum*)

monandra. 2. L. panicula effusa, spicis remotis laxis, spiculis secundis subrotundis monandris, glumis lævibus. *Jamaica.*

hexandra. 3. L. panicula effusa, spiculis alternis hexandris, glumis sublævibus. *Jamaica.*

oryzoides. 1. L. *panicula effusa, spiculis triandris, glumarum carinis ciliatis.* Phalaris oryzoides. *Linn.*

PASPATUM.

conjugatum. 7. P. spicis duabus horizontalibus conjugatis, spiculis ovatis, culmo erecto, foliis involutis. P. conjugatum. *Berg. act. Helv.* 7. 129. t. VIII. *India occidentalis.*

vaginatum. 8. P. spicis duabus, spiculis bifariis acuminatis, culmo ramoso geniculato, geniculis vaginatis. *Jamaica.*

filiforme. 6. P. ſpica ſubſolitaris lineari-ſecunda, ſpiculis alternis ovatis compresſis, culmo foliisque filiformibus.
Jamaica.

decumbens. 10. P. ſpica unica ſecunda, pedunculis longisſimis, ſpiculis alternis, orbiculato-acuminatis glabris, culmo procumbente.
Jamaica.

PANICUM.

ſetoſum. 6–7. P. ſpica compoſita, ſpiculis paniculato-faſciculatis, ſetis floſculis immixtis longisſimis, pedunculis ſubglabris.
Jamaica.

piloſum. 11–12. P. ſpicis paniculatis alternis ſecundis, ſpiculis geminis, altero minore, acuminatis lævibus; rachi compresſo piloſo, culmo divaricato geniculato.
Milium jamaicenſe polyſtachion latifolium, ſemine duplicato. *Sloan. h.* 1. *p.* 114.
Jamaica.

molle. 11–12. P. ſpicis paniculatis alternis ſecundis patentibus, ſpiculis approximatis pedicellatis ſecundis muticis.
Panicum 2. *Brown. jam.* 133.
India occidentalis.

faſciculatum. 11–12. P. ſpicis paniculatis alternis erectis, ſubfaſtigiatis, ſpiculis ſecundis ſubrotundis.
Jamaica.

Chartaginenſe. 11–12. P. ſpicis paniculatis, foliis brevioribus, ſpiculis ſecundis ovatis acutis, culmo proſtrato geniculato ramoſisſimo, vaginis pubeſcentibus.
America meridionalis, Chartagena. ♃.

nemoroſum. 26–27. P. panicula ſimplici, ramis diſtantibus erectis, floſculis remotis ſparſis ovatis acuminatis; culmo decumbente geniculato-vaginis colloque piloſis.
Jamaica, Domingo.

acumi-

acuminatum. 26–27. P. paniculis ſimplicibus foliis brevioribus, ramis capillaribus diffuſis, ſpiculis remotis obovatis, culmo decumbente geniculato ramoſo, foliis lanceolato-ſubulatis erectis, vaginisque villoſis.
Jamaica.

rigens. 26–27. P. panicula ſimplici rigida patente, culmo ramoſo decumbente, foliis horizontalibus ſcabris.
Jamaica.

fuſcum. 26–27. P. panicula ſimplici, ramis erectis, floſculis ſecundis geminis, altero brevius pedicellato, culmo erecto ſubdiviſo; foliis lato-lanceolatis.
Jamaica.

laxum. 26–27. P. panicula ſimplici nutante, ramis capillaribus, ſpiculis approximatis alternis adpreſſis, culmo ſimplici filiformi flaccido, foliis lineari-lanceolatis.
Milium. *Sloan. Hiſt.* 1. 114.
Jamaica.

flaveſcens. 27–28. P. panicula ſimplici erecta ſtricta, ramis ſubfaſtigiatis, infimis oppoſitis, ſpiculis approximatis ſecundis, pedicellis bifloris.
Jamaica.

diffuſum. 27–28. P. panicula ſimpliciuſcula capillari patenti, ſpiculis diſtantibns, culmo decumbente ſimplici, foliis linearibus, collo piloſis. Milium jam. anguſtifolium, panicula ſparſa. *Sloan. hiſt.* I. 114.
Jamaica, Hiſpaniola.

oryzoides. 27–28. P. panicula ſubſimplici, ramis erectis, floſculis remotiuſculis ovatis acutis, culmo erecto indiviſo, foliis lato-lanceolatis baſi rotundatis, vaginis lævibus. Milium jamaicenſe arundinis folio. *Sloan. hiſt.* I. *p.* 104.
Jamaica.

pallens. 32–33. P. panicula compoſita ovata, ramis confertis erectis, ſpiculis ovatis ſubulatis, culmo ſubdiviſo geniculato, foliis ovato-lanceolatis, vaginis collo margineque ciliatis.
Apluda Zeugitis. *Aubl. guian.*
Jamaica.

lanatum. 32–33. P. panicula composita erecta glabra, spiculis ovatis, culmo ramoso, foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, vaginis lanuginoso-hirsutis.
Jamaica.

Arundinaceum. 32–32. P. panicula composita patente, ramis ramulisque strictis capillaribus, spiculis subrotundis, culmo subdiviso geniculato, foliis lato-lanceolatis acuminatis rigidis.
Jamaica.

polygamum. 32–33. P. panicula composita capillari patente, flosculis polygamis, culmo articulis hirsutis. Holcus. 2. *Brown. jam.* 366.
India occidentalis. ♃.

glutinosum. 32–33. P. panicula composita patente, ramis flexuosis, spiculis pedicellatis distantibus glutinosis, culmo erecto simplici, foliis latioribus. *Sloan.* h. 1. 114. t. 71. *f.* 3.
Jamaica.

tricboides. 33–34. P. panicula ramosissima patente, ramis ramulisque subdivisis capillaribus, culmo declinato geniculato, foliis ovato-lanceolatis glaberrimis. *Sloan.* h. 1. 86. 115. t. 72. f. 3.
Jamaica, Hispaniola.

MILIUM.

compressum. 4–5. M. spicis subternis, flosculis alternis muticis rachi adpressis, culmo medio articulato-compresso, pedunculis longissimis.
Jamaica, India occidentalis. ♃.

paniceum. 4–6. M. spicis subdigitatis alternis approximatis filiformibus; flosculis secundis muticis adpressis trigonis.
Jamaica.

digitatum. 4–5. M. spicis digitatis sub4-ternis subsessilibus, flosculis muticis adpressis secundis, foliis margine cartilagineo-serratis.
Jamaica.

villosum. 9. M. panicula laxa, flosculis muticis, calycibus lanatis. Andropogon insulare *Linn.*
India occidentalis. ☉.

AGRO-

AGROSTIS.

purpurascens. 24–25. A. panicula contracta elongata, ramis adpressis erectis, flosculis inæqualibus acuminatis. Gramen pratense panicula & foliis angustissimis — *Sloan.* h. 1. 115.
Jamaica.

MANISURIS.

granularis. 2. M. spicis lateralibus, valvulis exterioribus orbiculatis punctato-callosis, vaginis pilosis; culmo erecto.
Cenchrus granularis. *Linn.*
Gramen Cyperoides — *Sloan.* j. 36. h. 1. p. 128. t. 80. a Linnæo pro Panico clandestino citatum.
Jamaica.

myurus. 1. M. *spicis lateralibus, valvulis exterioribus planis ovatis, apice lateribusque emarginatis, culmo adscendente.* Manisuris myurus. *Linn.*

CHLORIS.

POLYGAM. CAL. *Gluma communis* 2-valvis 2-flora, flosculo hermaphrodito sessili.
☿ *Cal.* O. *Cor. Gluma* 2-valvis, arista terminali.
♂ *Cal.* O. *Cor. Gluma.* 1-valvis aristata.

cruciata. 1. C. spicis subquaternis cruciatis, flosculis acuminatis. Agrostis cruciata *Linn.*
Jamaica.

ciliata. 2. C. spicis digitatis subqvinis; glumis corollinis margine ciliatis.
Jamaica.

petræa. 3. C. spicis quaternis strictis erectiusculis, spiculis confertis glabris muticis, culmo compresso.
Jamaica.

polydactyla. 4. C. ſpicis plurimis faſciculatis laxis, glumis corollinis margine ciliato-villoſis.
Andropogon polydactylon. *Linn.*
Jamaica.

radiata. 5. C. ſpicis (ſubſenis) plurimis faſciculatis erectiuſculis, floſculis ſubulatis ariſtatis glabris.
Agroſtis radiata *Linn.*
Andropogon faſciculatum *Linn.*
India occidentalis.

ANDROPOGON.

ſacharoides. 5–6. A. paniculæ ramis ſimplicibus, floſculis geminis, hermaphrodito ariſtato seſſili, altero mutico pedicellato tabeſcente, pedicellis rachisque lanatis.
Jamaica.

faſtigiatum. 12-13. A. paniculæ ſpicis ſolitariis, pedunculis elongatis, ſubfaſtigiatis, rachi lanata, floſculis ariſtatis, maſculo fertili.
Jamaica.

breviſolium. 23.– A. ſpicis lateralibus ſolitariis, floſculis alternis remotis ariſtatis, culmo geniculato compreſſo.
Jamaica.

CENCHRUS.

ſetoſus. 4–5. C. ſpica lineari-oblonga, involucris ſetoſis, ſetis inermibus, interioribus baſi villoſis, villis ciliatis, glumis lævibus.
India occidentalis.

POA.

glutinoſa. 8–9. P. panicula patente ſtricta, ſpiculis ſubnovemfloris hirſutiuſculis glutinoſis, culmo ſimplici, foliis ſubpiloſis. *Sloan.* h. 114. t. 71. *f.* 2.
Jamaica.

poli-

prolifera. 8–9. P. panicula patente ſtricta, ſpiculis multifloris, (18—20) culmo ramoſiſſimo nodoſo, ad nodos prolifero. *.
Inſulæ caribææ.

PICRAMNIA.

DIOIC. ♂. *Calyx* tripartitus.
Cor. tripetala
♀. *Cal. Cor.* maris.
Bacca bilocularis.
(poſt *Oſyridem*).

Antideſma. 1. PICRAMNIA.
Antideſma. *Brown. jam.* 123. Berberis fruticoſa, racemoſa, fraxini-folio alato, fructu nigro dipyreno. *Sloan.* h. 2. 101. t. 209. *f.* 2.
Jamaica, Domingo. ♄.

TRIGYNIA.

HOLOSTEUM.

diandrum. 1–2. H. caulibus procumbentibus rigidioribus, foliis ſubrotundis, floribus diandris.
Jamaica. ☉.

PHYLLANTHUS.

nutans. 1–2. P. fruticoſa, foliis alternis ovalibus ſubtus glaucis; racemis terminalibus folioſis nutantibus. Tilia forte arbor racemoſa, folio longiore ſubtus albicante. *Sloan.* h. 2. 19. t. 158. *f.* 3.
Jamaica. ♄.

mimoſoides. 1–2. P. caule fruticoſo, ramis virgatis, foliis pinnatis floriferis. *
Antigua. ♄.

Conami-

Conami. 1–2. P. caule fruticoso ramosissimo, ramis diffusis, foliis petiolatis subrotundis, apice attenuatis obtusiusculis, pedunculis fasciculatis axillaribus.
Conami brasiliensis. *Aubl. gvian.* 926. t. 354.
India occidentalis. ♄.

XYLOPHYLLA.

arbuscula. 2. X. foliis pinnatis lanceolatis acuminatis subcrenatis coriaceis, floribus pedunculatis triandris monoicis.
Jamaica. ♄.

falcata. 3. X. foliis sparsis lineari-lanceolatis subfalcatis crenatis, floribus subsessilibus triandris monoicis. * *Pluk. ph.* t. 247. 4.
Synon. et. figur. Commelin. Catesb. Sebæ.
Bahama. ♄.

angustifolia. 4. X. foliis pinnatis lineari-lanceolatis lineatis crenatis, floribus pedunculatis hermaphroditis. Phyllanthus 2. *Brown. jam.* 188.
Jamaica. ♄.

linearis. b. foliis linearibus lineatis, floribus albis.

montana. 5. X. foliis distichis lato-lanceolatis inciso-crenatis; ramis apice ancipitibus, floribus sessilibus.
Jamaica. ♄.

latifolia. 1. X. *foliis pinnatis lato-lanceolatis crenatis; floribus pedunculatis hermaphroditis hexandris, femineisque mixtis.* X. latifolia. *Linn.*

CLAS-

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

ERNODEA. (XLVII. æ.)

Cor. 1 petala, hypocrateriformis.
Cal. 4-partitus.
Bacca 2-loculariss. *Sem.* solitaria.
(pone *Pauettam.*)

littoralis. 1. ERNODEA. Knoxia 1. *Brown. jam.* 140. Thymelæa — *Sloan.* j. 168. h. 2. p. 93. l. 189. f. 1. 2.
Jamaica ♄.

HEDYOTIS.

rupestris. 7. H. foliis 4-fariis subulatis canaliculatis, floribus sessilibus axillaribus, corollis villosis tubo curvo. Hedyotis americana. *Jacq. am. p.* 20.
Thymelæa &c. *Sloan.* h. 2. *p.* 94. *l.* 202. *f.* 1.
India occidentalis. ♄.

SPERMACOCE.

villosa. 3–4. S. villosa, simplex, foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, summis qvaternis, floribus verticillatis, staminibus inclusis.
Pulegium &c. *Sloan.* cat. 64.
Jamaica. ☉.

DIODIA.

simplex. 2. D. caule herbaceo simplici erectiusculo lævi, foliis ovato-lanceolatis.
Jamaica.

proſtrata. 3 D. caule ſuffruticoſo ſubdiviſo, ramis proſtratis filiformibus, foliis linearibus hirſutiuſculis revolutis. Diodioides *Loefl. it.* 201.
Jamaica.

ſcandens. 4. D. caule ſcandenti ſuffruticoſo, foliis ovato-lanceolatis rigidis ſcabris.
Hiſpaniola. ♄.

ſarmentoſa. 5. D. caule flaccido fruticoſo, ramis oppoſitis patentibus, foliis oblongis acutis ſcabriuſculis.
Jamaica. ♄.

CATESBAEA.

parviflora. 2. C. corollis tubo tetragono abbreviato, baccis ſubrotundis.
Jamaica. ♄.

longiflora. 1. C. *corollis tubo longisſimo, baccis ovalibus.* C. ſpinoſa *Linn.*

IXORA.

faſciculata. 3. I. foliis ovato-ellipticis, ramulorum ſubfaſciculatis pedunculis filiformibus ſub 3-floris.*
Jamaica. ♄.

multiflora. 4. I. ? foliis lanceolato-ovatis faſciculatis, pedunculis aggregatis unifloris brevisſimis, baccis monoſpermis. ♄.
Jamaica.

HOFFMANNIA.

Calyx. 4 dentatus
Corolla hypocrateriſ. 4-partita.
Filamenta nulla.
Bacca bilocularis, polyſperma.
(poſt *Peteſiam*).

pedunculata. 1. HOFFMANNIA.
Jamaica.

COC-

COCCOSIPSILUM. (Browne)

Calyx quadripartitus, ſuperus.
Corolla infundibuliformis.
Bacca inflata, 2-locularis, polyſperma.
(inter *Mitchellam* et *Callicarpam.*)

repens. 1. COCCOSIPSILUM. *Brown. jam.* 144.
Jamaica.

WALLENIA.

Calyx quadrifidus, inferus.
Corolla tubuloſa, 4-fida.
Bacca 1-ſperma.
(ante *Callicarpam*).

laurifolia. 1. WALLENIA.
Peteſioides laurifolium. *Jacq. am.* 17.
Bryonia nigra fruticoſa, foliis laurinis.
Sloan. h. 2. 234. *t.* 145. *f.* 5.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

CALLICARPA.

ferruginea. 1–2. C. foliis lato-lanceolatis ſerratis ſubtus ſcabriuſculis, cymis terminalibus axillaribusque.
Jamaica. ♄.

reticulata 1–2. C. foliis elliptico-lanceolatis ſubſerratis rugoſis, ſubtus tomentoſo incanis. *
Jamaica. ♄.

AEGIPHILA.

elata. 2. Æ. foliis ellipticis acuminatis membranaceis, paniculis terminalibus, calycibus pubeſcentibus.
Knoxia 2. *Brown. jam.* 142.
India occidentalis. ♄

foetida

foetida. 3. Æ. foliis ouato-lanceolatis, subtus petiolisque hirsutis, pedunculis axillaribus, solitariis. *Jamaica.* ♄.

trifida. 4. Æ. foliis ovato-lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus trifidis confertis. *Jamaica.* ♄.

SAMARA.

coriacea. 2. S. floribus sessilibus conglomeratis, foliis lanceolato-ovatis acutis subcoriaceis. *Jamaica.* ♄.

LABATIA.

Calyx 4-phyllus, inferus.
Corolla subcampanulata, 4-fida.
Laciniæ 2 minutæ in divisuris corollæ.
Capsula 4-locularis.
Sem. solitaria.
(inter *Blæriam* & *Budlæam.*)

sessiliflora. 1. LABATIA. *Hispaniola.* ♄.

VISCUM.

flavens. 6–7. V. foliis ouatis venosis, racemis axillaribus utrinque ternis, 4-ternisque.
Viscum aliud racemosum, foliis latissimis. *Plum. ic.* 256. t. 258. f. 4.
Viscum racemosum. *Aubl. guian.* 895. 4.
India occidentalis. ♄.

POTHOS.

violacea. 3–4. P. foliis ovato-lanceolatis integris nervosis punctatis. Arum 13. *Brown. jam.* 333.
Dracontium scandens. *Aubl. guian.* 836. 3.
Jamaica, India occidentalis. ♃.

marcre-

macrophylla. 5–6. P. foliis cordatis, ſpadice longisſima, radice nodoſa.
Dracontium amplis foliis cordatis, radice nodoſa rubra. *Plum. fil.* t. 63.
Dracontium cordatum. *Aubl. gvian.* 836. 3.
India occidentalis. ♃.

AMMANNIA.

ſangvinolenta. 3–4. A. foliis ſemiamplexicaulibus, baſi cordatis, floribus ſubpedunculatis, octandris petaligeris.
Jamaica, Domingo.

FAGARA.

trifoliata. 1–2. F. foliis ternatis foliolis obovatis ſubemarginatis integris nitidis ſubtus punctatis. *
Dominica. ♄.

emarginata. 5. F. foliis pinnatis, foliolis ovatis emarginatis venoſis, racemis terminalibus compoſitis, floribus triandris.
Lauro affinis therebinthi folio alato ligno odorato candido. *Sloan.* h. 2. 24. t: 168. f. 4.
Jamaica. ♄

ſpinoſa. 5. F. foliis pinnatis ſesſilibus ovatis acuminatis ſubtus ramisque ſpinoſis, floribus 3-andris.
Jamaica. ♄.

acuminata. 5. F. foliis pinnatis, foliolis integris ellipticis acuminatis nitidis coriaceis, floribus cymoſis 3-andris. *.
Jamaica. ♄.

LUDWIGIA.

repens. 2–3. L. foliis oppoſitis ovatis, pedunculis ſolitariis axillaribus, caule repente.
Jamaica. ☉.

DORSTENIA.

cordifolia. 1-2. D. ſcapis radicatis, foliis cordatis ovatis denticulatis, receptaculis orbiculatis.
D. cordifolia *Lamark Encycl.* 2. p. 317. 2.
Jamaica, domingo. ♃.

BOEHMERIA. Jacq. (LIII.)

MONOIC. ♂. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* O.
♀. *Calyx* nullus, ſed ſquamæ confertæ, inter quas ſingulas:
Germen obovatum.
Stylus unicus.
Semen unicum, compreſſum.
(ante *Urticam*).

caudata. 1. B. foliis oppoſitis ovatis acutis ſerratis, racemis longisſimis pendulis, floribus dioicis, caule ſuffruticoſo.
Urtica. 11. *Brown. jam.* 337.
Jamaica. ♄.

littoralis. 2. B. foliis oppoſitis ovato-lanceolatis ſerratis, floribus conglomeratis axillaribus monoicis mixtis, caule herbaceo tetragono.
Hiſpaniola.

cylindrica. 3. B. foliis oppoſitis ovatis acuminatis ſerratis, racemis ſpicatis axillaribus erectis ſimplicibus. Urtica cylindrica *Linn.*

ramiflora. 4. B. foliis alternis lato-lanceolatis acuminatis ſerratis rugoſis, floribus aggregatis axillaribus lateralibusque monoicis diſtinctis, maſculis triandris.
B. ramiflora. *Jacq. am.* 246. t. 137.
Caturus ramiflorus. *Linn.* Urtica 10. *Brown. jam.* 337.
India occidentalis ♃.

hirta. 5. B. foliis alternis ovatis acutis ſerratis hirſutis, floribus monoicis congeſtis axillaribus mixtis.
Jamaica.

URTI-

URTICA.

* *Foliis oppositis.*

reticulata. 5–6. U. foliis oppositis oblongis acutis subtus reticulatis, stipulis ovatis integris, racemis paniculatis, foliis brevioribus.
Act. Holm. Tom. VI. 1. 30.—VIII. 1. 70.
Jamaica.

laxa. 6–7. U. foliis oppos. ovatis acuminatis serratis; floribus dioicis, masculis pedunculatis confertis, femineis racemosis, caule laxo.
Act. Holm. t. VIII. 1. 58.
Hispaniola.

Betulæfolia. 6–7. U. foliis oppos. cordato-subrotundis serratis, stipulis integris, floribus racemosis, caule prostrato adscendente.
Act. Holm. t. VIII. 1. 59.
Hispaniola.

diffusa. 6–7. U. foliis oppos. ovatis acute serratis hispidis, stipulis revolutis, racemis paniculatis folio longioribus; caulibus procumbentibus.
Act. Holm. t. VI. 1. 30.
Jamaica.

rufa. 6–7. U. hirsuta tota; foliis oppos. oblongis serratis, stipulis subrotundis persistentibus; racemis terminalibus, caule suffrutescente ramoso. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 59.
Jamaica.

rugosa. 7–8. U. fol. oppos. oblongis serratis nervosis rugosis, racemulis terminalibus dioicis; caule simplici erecto. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 60.
Hispaniola.

repens. 7–8. U. foliis oppos. ovalibus monoicis, caule simplici repente. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 61.
Hispaniola.

nudicaulis. 9–10. U. foliis subterminalibus oppositis oblongis acuminatis integris trinerviis; caule angulofo, inferne nudo racemifero, floribus dioicis.
Act. Holm. t. VI. 1. 36. VIII. 1. 71.
Jamaica.

ſtolonifera.	9–10. U.	ſubcauleſcens, foliis oppoſitis oblongis ſubſerratis, floribus dioicis, ſtolonibus radicalibus. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 62. *Hiſpaniola.*
ciliata.	11–12. U.	foliis oppoſ. ovatis ciliatis ſerratis, floribus terminalibus aggregatis ſubpedunculatis monoicis; caule divaricato. *Act. Holm.* t. VI. 1. 32. *Jamaica.*
radicans.	11–12. U.	foliis oppoſ. cuneato-ovatis crenatis nitidis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, caule ramisque radicantibus. *Act. Holm.* t. VI. 1. 29. t. VIII. 1. 71. *Jamaica.*
nummularifolia.	12–13. U.	foliis oppoſ. orbiculatis crenatis hirſutis, floribus terminalibus confertis monoicis; caule filiformi ſimplici repente. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 63. tab. 1. f. 2. Nummularia ſaxatilis minima repens, floribus albis, fol. crenatis villoſis. *Sloan. H.* 1. 206. t. 131. f. 4. *Jamaica.*
depreſſa.	12-13. U.	foliis oppoſ. ſubrotundis crenatis glabris; floribus terminalibus confertis, caule repente ſubdiviſo. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 64. *Jamaica.*
herniarioides.	12–13. U.	foliis oppoſ. ſubrotundis integris terminalibus qvaternis, floribus monoicis diſtinctis; caule filiformi diffuſo. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 64. tab. 2. f. 1. *Hiſpaniola.* ⊙.
ſerrulata.	12–13. U.	foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus foliis brevioribus, floribus capitellatis monoicis; caule fruteſcente tetragono. *Act. Holm.* h. VIII. 1. 65. *Jamaica.* ♄.
lucida.	12-13. U.	foliis oppoſ. ſemipinnatis nitidis, pedunculis axillaribus folio longioribus, floribus capitellatis; caule fruteſcente angulato. *Act. Holm.* t. VI. 1. 31. VIII. 1. 70. *Jamaica.* ♄.

micro-

micro-phylla. 12-13. U. foliis ovatis acutis integerrimis, minoribus ovatis oppositis et intermixtis, floribus dioicis; caulibus simpliciusculis adscendentibus. Parietaria microphylla *Linn. Act. Holm.* VIII. 1. 60.

trianthemoides. 12-13. U. foliis oppos. oblongis integerrimis, alternis majoribus, floribus monoicis, caule erecto ramoso. *Act. Holm.* VIII. 1. 68. *Hispaniola.*

cuneifolia. 12-13. U. foliis oppos. cuneatis obovatis apice dentatis, alternis majoribus; racemulis pedunculatis, floribus monoicis. U. crenulata. *Act. Holm.* VI. 1. 35. VIII. 1. 70. *Jamaica.*

* * *Foliis alternis.*

lappulacea. 12-13. U. foliis alternis ovatis scabriusculis, floribus terminalibus subsessilibus monoicis, seminibus trigonis; caule diffuso. U. humilis. *Act. Holm.* VI. 1. 34. VIII. 1. 69. tab. 2. f. 2. *Jamaica*, *Domingo.*

sessiliflora. 13-14. U. foliis alternis lanceolato-ovatis crenatis, racemis brevissimis axillaribus, floribus monoicis distinctis; caule erecto. l. c. VI. 1. 33. *Jamaica.*

elata. 15-16. U. foliis alternis ovatis acutis serratis, caule arboreo, ramis nudiusculis racemiferis, floribus dioicis. *Jamaica.*

MANETTIA.

Lygistum. 2. M. foliis ovatis acutis venosis, caule volubili suffrutescente. Petesia Lygistum. *Linn.* Lygistum. *Brown. jam.* 142. t. 3. f. 2. *Jamaica.*

reclinata. 1. M. *foliis ovatis acutis pubescentibus, caule reclinato herbaceo.* M. reclinata. *Linn.*

ALCHEMILLA.

monandria. 1–2. A. foliis tripartito trifidis hirsutis; floribus monandris confertis axillaribus.

DIGYNIA.

SCHÆFFERIA. Jacq.

DIOIC. ♂. *Calyx* 4-5-phyllus.
Cor. 4-petala aut nulla.
♀. *Calyx* 4-5-partitus.
Cor. 4-petala aut nulla.
Bacca 2-locularis.
Sem. solitaria.

completa. 1. S. floribus 4-petalis axillaribus. Schæfferia frutescens. *Jacq. am.* 259.
Buxi folio majore acuminato, arbor baccifera, fructu minore crocco dipyreno. *Sloan. h.* 102. t. 209. f. 1.
India occidentali. ♄.

lateriflora. 2. L. floribus lateralibus apetalis.
Hispaniola. ♄.

TRIGYNIA.

CRANTZIA. (XLIV.)

MONOIC. ♂. *Calyx* 4-phyllus.
Cor. O. *Filamenta* ovata.
♀. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* O.
Styli conici.
Capsula 3-cornis, 3-locularis.
Sem. bina.
(inter *Littorellam et Ciccam.*)

lævigata. 1. CRANTZIA.
Jamaica. ♄.

ARGY-

ARGYTHAMNIA. (XXXVIII.)

MONOIC. ♂. *Calyx* 4-phyllus.
Corolla 4-petala.
♀. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* O.
Styli dichotomi.
Capsula 3-cocca. *Sem.* solitaria.
(post *Ciccam.*)

candicans. 1. ARGYTHAMNIA. *Brown. jam.* 338.
Ricino affinis odorifera fruticosa minor &c.
Sloan. h. 2. 132. t. 86. 3.
Jamaica. ♄.

TETRAGYNIA.

MYGINDA.

Rhacoma. 2. M. foliis lanceolato-ovatis obtusis crenatis, floribus monogynis, stylo 4-fido.
Rhacoma crossopetalum *Linn.*

latifolia. 3. M. foliis ellipticis crenulatis coriaceis, floribus stigmatibus 2 4 sessilibus. *
India occidentalis. ♄.

uragoga. 1. M. *foliis subcordatis acuminatis subserratis pubescentibus.* M. uragoga *Linn. Jacq.*

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

HELIOTROPIUM.

inundatum. 3-4. H. foliis oblongis obtusis hirsutis, spicis quaternis erectis; caule frutescente.
Insulæ caribææ. ☉

ANAGALLIS.

pumila. 1-2. A. caule erecto, foliis subrotundis acutis sessilibus.
Jamaica. ☉.

TOURNEFORTIA.

bicolor. 4-6. T. foliis ovatis acuminatis glabris, superne rugosiusculis; spicis cymosis erectis recurvis.
Jamaica. ♄.

LISIANTHUS.

exsertus. 5. L. foliis ovato-lanceolatis, pedunculis trichotomis, genitalibus longissimis.
Jamaica. ♄.

latifolius. 6. L. foliis lanceolato-ellipticis acuminatis, pedunculis trichotomis, laciniis corollæ erectis, genitalibus inclusis.
Jamaica. ♄.

umbellatus. 7. L. foliis elongatis obovatis, floribus terminalibus pedunculatis umbellatis, laciniis corollæ brevissimis obtusis erectis.
Jamaica. ♄.

frigidus. 8. L. foliis ovatis acuminatis coriaceis, panicula terminali trichotoma, corollis ventricosis, laciniis subrotundis. ☉
Guadeloupe montes. ♄.

RON-

RONDELETIA.

* *Sem. plura.*

pilosa. 3–4. R. foliis petiolatis ouatis utrinque pilosis, pedunculis axillaribus foliis brevioribus 3-fidis, floribus tetrandris. *
Jamaica. ♄.

virgata. 3–4. R. foliis petiolatis cordatis subrotundis, ramis lateralibus filiformibus patentibus floriferis apice trifidis, floribus confertis tetrandris.
Hispaniola. ♄.

** *Sem. subsolitaria.*

thyrsoidea. 3–4. R. foliis oblongis membranaceis, subtus pubescentibus, thyrsis lateralibus.
Jamaica. ♄.

tomentosa. 3–4. R. foliis ovatis acuminatis tomentosis, pedunculis tripartitis axillaribus brevibus.
Peresia 3. *Brown. jam.* 144.
Jamaica. ♄.

umbellulata. 3–4. R. foliis lanceolato-ovatis, sub-hirsutis, pedunculis axillaribus solitariis, apice trichotomis, floribus confertis.
Jamaica. ♄.

incana. 3–4. R. foliis ovato-lanceolatis, subtus incanis scabris; pedunculis axillaribus simplicibus trifloris.
Jamaica. ♄.

hirsuta. 3–4. R. foliis ovatis acutis hirsutis, pedunculis axillaribus trichotomis laxis, floribus hirsutis.
Jamaica. ♄.

hirta. 3–4. R. foliis ellipticis acuminatis hirtis nervosis, subtus pilosis rigidis, pedunculis axillaribus 3-partitis erectis. *
Jamaica. ♄.

CINCHONA.

floribunda. 4. C. floribus paniculatis glabris, capsulis turbinatis laevibus, foliis ellipticis acuminatis glabris. *Kinkina Piton.* Gall. *Act. Nat. curiosor.* 1787.
St. Lucia, Martinica, Hispaniola. ♄.

 bra-

brachycarpa. 5. C. floribus paniculatis glabris, capsulis ovatis costatis; foliis ellipticis obtusis glabris. * *Jamaica.* ♄.

angustifolia. 6. C. floribus paniculatis glabris, capsulis oblongis pentagonis, foliis lineari-lanceolatis pubescentibus. *Act. Stockh.* 1787. VIII. 2. 117. *tab.* III. *Hispaniola.* ♄.

BELLONIA.

spinosa. 2. B. spinosa, foliis ovatis angulatis, dentato-serratis, pedunculis axillaribus unifloris. *Hispaniola.* ♄.

aspera. 1. B. *foliis ovatis serratis, floribus corymbosis terminalibus. Plum. Linn.*

PORTLANDIA.

coccinea. 1–2. P. floribus pentandris, foliis ellipticis coriaceis. *Jamaica.* ♄.

SOLANDRA. (XL.)

Cor. infundibuliformis, maxima.
Cal. rumpens.
Stam. inclinata.
Bacca supera 4-locularis polysperma.
(pone *Portlandiam.*)

grandiflora. 1. SOLANDRA. *Act. Stockh.* VIII. 4. 300. tab. XI. Stramonium scandens flore luteo. *Plum. fig.* *Jamaica.* ♄.

PSYCHOTRIA.

hirsuta. P. stipulis lanceolatis integris deciduis, foliis ovato-lanceolatis hirsutis, caule hirsutissimo, panicula patente. *Jamaica.* ♄.

glabra.

glabrata, P. ſtipulis indiviſis deciduis, foliis ovatis glaberrimis nitidis, floribus paniculatis erectis.
Jamaica. ♄.

Laurifolia, P. ſtipulis ovatis acuminatis deciduis, foliis ovato-lanceolatis craſſiuſculis glabris, paniculis erectis, baccis ſubrotundis.
Hiſpaniola. ♄.

Citrifolia. P. ſtipulis ovatis perſiſtentibus, foliis ellipticis acuminatis glaberrimis ſubcoriaceis; panicula foliis breviore, baccis oblongis coſtatis. *
India occidentalis. ♄.

tenuifolia, P. ſtipulis ovatis apice 2-fidis deciduis, foliis oblongis acutis tenuioribus glabris; paniculis erectis.
Hiſpaniola. ♄.

nervoſa, P. ſtipulis ovatis emarginatis deciduis, foliis ovatis acuminatis nervoſis ſubundulatis, paniculis erectis.
P. chartaginenſis? *Jacqu. am.* 65. t. 174. f. 22.
Jamaica. ♄.

foetens, P. ſtipulis acuminatis integris deciduis, foliis lanceolato ovatis glabris, panicula patentiſſima, pedunculis reflexis filiformibus.
Jamaica. ♄.

marginata, P. ſtipulis integris acuminatis, foliis lanceolato-ovatis, margine cartilagineo-ſetoſis; paniculis laxis.
Pſychothrophum 6. *Brown. jam.* 161.
Jamaica. ♄.

grandis. P. ſtipulis triangularibus revolutis, apicibus convolutis ſubulatis; foliis cuneiformibus obovatis, caule angulato ſuffruteſcente.
Jamaica, *Domingo*. ♄.

uliginoſa, P. ſtipulis connatis acutis convexis; foliis lanceolato ovatis, ſeminibus compreſſis criſtatis, caule ſubherbaceo erecto.
Pſychotrophum. 1. *Brown. jam.* 160.
Jamaica.

nutans, P. ſtipulis geminis ſubulatis, foliis lanceolatis acutis nervoſis, floribus cymoſis, baccis nutantibus.
Hiſpaniola, ♄.

horizontalis. P. ſtipulis ovatis, foliis lanceolato-ovatis acutis, ramis foliisque horizontalibus, floribus paniculatis.
Hiſpaniola. ♄.

paraſitica. P. ſtipulis amplexicaulibus integris, foliis ellipticis coriaceo-ſubſucculentis, cymis pedunculatis trichotomis, longitudine foliorum. * Viſcoides pendulum *Jacq. am.* 73. t. 51. f. 1.
India occidentalis, Montſerrat. &c. ♄.

myrſtiphyllum. P. exſtipulata, foliis lanceolato-ovatis integris nitidis rigidis, ramis ſecundis, floribus paniculatis. Myrstiphyllum *Brown. jam.* 152. *Sloan.* h. 2. 102. t. 209. f. 2.
Jamaica ♄.

pubeſcens. P. ſtipulis geminis ſubulatis, foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, paniculis erectis, corollis cylindricis. Pſycotrophum 5. *Brown. jam.* 161.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

pedunculata. P. ſtipulis bidentatis, foliis ovato-lanceolatis rugoſis, floribus cymoſis, pedunculis elongatis. Pſycotrophum 4. *Brown. jam.* 160.
Jamaica. ♄.

crocea. P. ſtipulis geminis ſubulatis, foliis ovatis nervoſis, panicula erecta terminali crocea, pedunculis coloratis. Pſychotrophum 2. *Brown. jam.* 160. t. 13. f. 2, 1.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

alpina. P. ſtipulis truncatis bidentatis, foliis membranaceis multinerviis, panicula erecta, corollis cylindricis elongatis diaphanis. Chiococca paniculata *Linn. ſuppl.* ?
Jamaica. ♄.

corymboſa. P. ſtipulis geminis acutis, foliis ovato-lanceolatis conſiſtentibus nitidis; floribus erectis cylindraceis; baccis corymboſis, pedunculis coloratis.
Jamaica. ♄.

patens.

patens. P. stipulis geminis subulatis, foliis distichis ovato-lanceolatis membranaceis, ramis patentibus, panicula secunda. Nonatelia paniculata. *Aubl. guian.* 184. tab. 70. f. 2.? *Jamaica.* ♄.

brachiata. P. stipulis ovatis bifidis, racemis brachiatis, floribus terminalibus aggregatis sessilibus. *Jamaica.* ♄.

involucrata. P. stipulis utrinque bidentatis, foliis ovato-lanceolatis glaberrimis, pedunculis trifloris terminalibus, floribus involucratis, involucro 3-phyllo. * Nonatelia officinalis. *Aubl. guian.* 182. t. 70. f. 1. *India occidentalis.* ♄.

Pavettæ. P. stipulis subulatis deciduis, ramis paniculæ brachiatis trichotomis, corollis tubo longiori, laciniis patentibus. Lonicera foliis lanceolato-ovatis. *Plum. ic.* t. 156. f. 1. Ceraso affinis arbor baccifera, fructu cæruleo testiculato. *Sloan.* h. 2. 96. t. 189. f. 4. *India occidentalis.* ♄.

CEPHAELIS. (XLVIII. d.)

Flores capitati involucrati.
Corolla tubulosa.
Stigma 2-partitum.
Bacca bisperma.
Receptaculum paleaceum.
(inter *Morindam* & *Conocarpum.*)

violacea. 1. C. capitulis globosis terminalibus, involucro 5-phyllo, foliis nervosis glabris. Tapogomea violacea. *Aubl. guian.* 157. t. 60. *India occidentalis.* ♄.

elata. 2. C. capitulis globosis terminalibus, pedunculis elongatis, involucro diphyllo, foliis glabris. *Jamaica.* ♄.

axillaris. 3. C. capitulis axillaribus sessilibus. * St. *Christopher.* ♄.

muſcoſa. 4. C. capitulis ſubrotundis ſubſeſſilibus terminalibus, paleis dentatis. Morinda muſcoſa *Jacq. amer.* 65. t. 45.
India occidentalis. ♄

HAMELLIA.

axillaris. 2. H. ſubherbacea, racemis axillaribus, floribus ſubſecundis ſeſſilibus, foliis ovato lanceolatis.
Jamaica, Hiſpaniola.

Chryſantha. 3. H. racemis terminalibus, foliis oblongis cuneatis acuminatis glaberrimis, floribus pedicellatis. Campanula 2. *Brown. jam.* 166. t. 14. f. 1.
Lonicera. *Plum.* ic. 218. f. 1.
Jamaica. ♄.

ventricoſa. 4. H. racemis terminalibus axillaribusque, corollis campanulatis ventricoſis, foliis ternatis. Campanula 1. *Brown. jam.* 166.
Jamaica. ♄.

coccinea. 1. H. racemis terminalibus coloratis, foliis ternatis villoſo-pubeſcentibus.
H. patens. *Linn.* ? *Jacq. am.* 72. t. 50.
Lonicera. *Plum. ic.* 218. f. 2.
Hiſpaniola. ♄.

SABICEA. Aublet (XLI. b.)

Involucrum 4- fidum.
Corolla infundibuliformis.
Stigma 5-partitum.
Bacca 5-locularis, polyſperma.
(poſt *Hamelliam.*)

hirta. 1. S. foliis ovato lanceolatis acuminatis hirſutis, floribus pedunculatis.
Jamaica. ♄.

cinerea. 2. S. foliis ellipticis acutis tomentoſis ſubtus incanis, floribus ſubſeſſilibus. *
Sabicea cinerea *Aubl. gvian.* 192. tab. 75.
India occidentalis. ♄

SOLA-

SOLANUM.

subinerme. 9–10. S. caule subinermi fruticoso, foliis elliptico-lanceolatis integris, supra glabris subtus incano-tomentosis. *Jacq. am.* 50.
S. laurifolium *Mill. dict.*
India occidentalis. ♄.

torvum. 26–27. S. caule aculeato fruticoso, aculeis curvis; foliis cordatis ovatis sinuatis tomentosis, rachibus aculeatis, calycibus inermibus.
Solanum Indicum. *Spec. pl.* 1.
India occidentalis. ♄.

scandens. 26–27. S. caule aculeato fruticoso scandenté, foliis angulatis, petiolis, rachibus calycibusque aculeatis, racemis laxis.
Hispaniola. ♄.

JAQUINIA.

venosa. 1–2. I. foliis ovato-lanceolatis venosis submembranaceis. *
India occidentalis. ♄.

CORDIA.

micranthus. 5-6. C. foliis ellipticis lanceolatis integerrimis membranaceis venosis, racemis compositis laxis.
India occidentalis., *Jamaica.* ♄.

elliptica. 5–6. C. foliis ellipticis acuminatis integris coriaceis, ramis compositis diffusis; drupis acuminatis.
Jamaica. ♄.

EHRETIA.

virgata. 3–4. E. foliis oblongis integris superne scabris, ramis filiformibus, floribus terminalibus sparsis, calycibus hirsutis.
Hispaniola. ♄.

VAR-

VARRONIA.

mirabilloides. 2–3. V. foliis ovatis rugosis serratis, floribus racemosis secundis, corollis hypocrateriformibus. V. Mirabilloides. *Jacq. am.* 41. t. 33.
Hispaniola. ♄.

ARDISIA.

Calyx 5-phyllus.
Cor. reflexa. *Stigma* simplex.
Drupa monosperma.
(inter *Varroniam & Laugueriam.*)

Tinifolia. 1. A. floribus paniculatis, foliis ellipticis integris nervosis, caule arboreo.
Jasminum forte arboreum, foliis laurinis obtusis. *Sloan.* h. 2. p. 98. t. 205.

coriacea. 2. A. floribus paniculatis, foliis oblongis integris aveniis coriaceis.
India occidentalis. ♄.

serrulata. 3. A. floribus paniculatis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis rugosis, caule fruticoso pubescente.
Domingo. ♄.

lateriflora. 4. A. racemis lateralibus axillaribusve compositis, floribus umbellatis, foliis oblongis acuminatis integerrimis, caule fruticoso. *
India occidentalis. ♄.

parasitica. 5. A. racemis axillaribus simplicibus, foliis sessilibus, lanceolato-ovatis lineatis, caule fruticoso. *
Montserrat. ♄.

LAUGERIA.

lucida. 2. L. foliis oblongis obtusis integris membranaceis nitidis, racemis dichotomis, drupis nucibus bilocularibus. *Loefl. it.* 270. n. 154.
India occidentalis, Jamaica. ♄.

tomentosa. 3. L. foliis ovatis acutis integris subtus tomentosis, racemis dichotomis, drupis nuce biloculari.
Jamaica. ♄.

odorata. 1. L. *foliis subovatis acutis glabris, caule subspinoso; racemis paniculatis, drupis nucibus 5-locularibus.* *Linn. Jacqu.*

CESTRUM.

hirtum. 5. C. floribus subspicatis axillaribus; foliis subcordatis ovatis acutis, subtus ramulisque hirtis.
India Occidentalis, Jamaica. ♄.

CHRYSOPHYLLUM.

monopyrenum. 1-2. C. foliis ellipticis acuminatis, subtus tomentoso-aureis, fructu ovato monospermo. Chrysophyllum 2. *Brown. jam.* 171.
India occidentalis. ♄.

microcarpum. 1-2. C. foliis ovatis glabris, subtus pubescentibus, baccis obliquis oblongis monospermis.
Hispaniola. ♄.

rugosum. 2-3. C. foliis oblongis acuminatis utrinque glabris, fructu acuminato rugoso.
Jamaica. ♄.

BUMELIA. (XLIII.)

Cor. 5 fida: *Nectario* 5-phyllo.
Drupa 1 sperma.
(pone *Sideroxylon.*)

nigra. 1. B. ramis virgatis patentibus, foliis terminalibus oblongo-lanceolatis glabris, margine undulatis, ramulis floriferis. Achras 6. *Brown. jam.* 201.
Jamaica. ♄.

pallida. 2 B. ramis erectis, foliis terminalibus ellipticis obtusis, floribus confertis lateralibus.
Jamaica. ♄.

retusa. 3. B. foliis oppositis cuneato-ovatis retusis rigidis, floribus confertis axillaribus. Achras 7. *Brown. jam.* 201.
Jamaica. &c. ♄.

montana. 4 B. foliis sparsis alternis oblongis apice obtusis, floribus axillaribus pedunculatis.
Jamaica. ♄.

salicifolia. 5. B. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, floribus confertis axillaribus & lateralibus. Achras salicifolia *Linn.*

rotundifolia. 6. B. foliis suborbiculatis marginatis venosis coriaceis utrinque glabris.
India occidentalis. ♄.

pentagona. 7. B. foliis lanceolatis acuminatis nitidis, floribus axillaribus, drupis pentagonis. *
India occidentalis, *Ins. S. Vincent.* ♄.

RHAMNUS.

ellipticus. 12–13. R. inermis, floribus hermaphroditis sub 3-gynis, fructibus trilocularibus, foliis ellipticis integris, umbellis axillaribus.
Rhamnus. *Brown. jam.* 172. 1. tab. 29. f. 2.
Jamaica. ♄.

sphærospermus. 12–13. R. inermis, floribus hermaphroditis racemulosis, baccis subrotundis 3-locularibus pellucidis, foliis oblongis serratis glabris.
Jamaica. ♄.

RUYSCHIA. Jacq.

Calyx 5-phyllus, bractea clauata subjecta.
Cor. reflexa. Stylus nullus.
Fructus polyspermus.
(Inter *Celastrum & Evonymum.*)

Clusiæfolia. 1. R. foliis obovatis integris aveniis; floribus bractea solitari. * Ruyschia Clusiæfolia. *Jacq. am.* 75. t. 51. 2.
India occidentalis. ♄.

Souroubea. 2. R. foliis obovatis emarginatis, apice denticulatis venosis; floribus bracteis tripartitis. * Sourouubea gvianensis. *Aubl. gvian.* p. 244. fig.
Gviana. ♄.

ITEA.

Cyrilla. 2. I. foliis lanceolatis integris membranaceis. Cyrilla racemiflora. *Linn.*
Jamaica. ♄.

HIR-

HIRTELLA.

triandra. 2. H. foliis oblongis acuminatis, racemis compositis laxis, floribus triandris.
Hirtella americana. *Jacq. amer.*
Jamaica, Domingo. ♄.

paniculata. 3. H. foliis ellipticis hirsutis nitidis subcoriaceis, racemis erectis, floribus 5-dris. *
Cayenna. ♄.

HEDERA.

pendula. 3. H. foliis ovato-lanceolatis integris, pedunculis longissimis pendulis.
Jamaica. ♄.

nutans. 4. H. foliis ellipticis coriaceis, umbellis nutantibus hæmisphæricis.
Jamaica. ♄.

ACHYRANTHES.

altissima. 7-8. A. caule suffruticoso scandente, paniculis terminalibus axillaribusque ramosis. *Jacq. amer.* 81. Celosioides *Loefl. it.* 301. Celosia. 2. *Brown. jam.* Blitum. *Sloan.* h. 1. p. 142. t. 91. f. 2. Amaranthus. *Plum. spec.* 6.
India occidentalis. ♄.

GARDENIA.

Genipa. 6-7. G. inermis, foliis oblongo-lanceolatis, pedunculis axillaribus multifloris, corollis hypocrateriformibus, tubo abbreviato. *
Genipa americana. *Linn. Fig. Plum.*

armata. 7-8. G. spinis ramulorum terminalibus quaternis, laciniis calycinis linearibus cuneiformibus, floribus confertis.
Mussenda spinosa *Linn. Jacqv.*

Randia. 7-8. P. (ſpinoſa) ſpinis ramorum decuſſatis, foliis ſubrotundis, corollis hypocrateriformibus, dentibus calycinis lanceolato-ſubulatis. Randia aculeata. *Linn. Brown. jam.* 143. t. 8. f. 1.

mitis. (b.) ſubinermis, foliis ſubovalibus. Randia mitis. *Linn.*

ECHITES.

domingenſis. 3-4. E. pedunculis racemoſis, foliis cordato-ovatis, rigidiuſculis, ſubtus diſcoloribus, caule volubili. E. domingenſis. *Jacqv. ic. rar. Coll.* 1. p. 73.
India occidentalis. ♄.

aſperuginis. 4-5. E. pedunculis racemoſis, folliculis filiformibus; foliis oblongis acutis, ſuperne aſperis, caule volubili.
Apocynum *Plum. ic.* XXVII.
India occidentalis, Jamaica, Domingo. ♄.?

circinalis 6-7. E. pedunculis axillaribus multifloris articulatis, laciniis corollæ undulatis; foliis ellipticis, caule volubili.
Hiſpaniola.

floribunda. 6-7. E. racemis corymboſis, foliis ovatis acuminatis, nervis paralellis, ramis erectiuſculis.
Jamaica. ♄.

TABERNÆMONTANA.

diſcolor. 5-6. T. foliis oppoſitis ouato-lanceolatis, pedunculis axillaribus bifloris.
Jamaica. ♄.

DIGYNIA.

CYNANCHUM.

criſpiflorum. 3-4. C. caule volubili, foliis ſubtus villoſis oblongis cordatis; ſinu clauſo, petalis apice criſpis. Periploca florum diviſuris circinnatis et criſpis. *Plum. ic.* 216. f. 1.
India occidentalis, Jamaica.

parvi-

parviflorum. 12–13. C. caule volubili filiformi, foliis ovatis apice subulatis, umbellis subsessilibus. Periploca foliis ovatis, etc. *Plum. ic.* 215. f. 1. *India occidentalis.*

ASCLEPIAS.

viminalis. 4–5. A. caule suffruticoso volubili filiformi, foliis oppositis lanceolatis glabris, umbellis lateralibus multifloris. Asclepias. 3. *Brown. jam.* 183. Apocynum *Sloan. Hist.* t. 131. Cynanchum. *Plum. ic.* 27. f. 2. ? *Jamaica.*

MICROTEA. (XII. a.)

Calyx 5-phyllus; patens. *Cor.* nulla.
Drupa sicca, echinata.
(ante *Salsolam.*)

debilis. 1. MICROTEA. *
St. Christopher. ⊙.

CELTIS.

aculeata. 2–3. C. foliis cordato-ovatis, apice obtusis subintegris glaberrimis, ramis aculeatis.
Rhamnus Iguaneus. *Jacq. am.* 74. 1.
Hispaniola. ♄.

micranthus. 4. C. foliis oblique cordatis ovato-lanceolatis serrulatis superne scabriusculis.
Rhamnus micranthus. *Linn.* Zizyphus arborescens. *Brown.*

lima. 5. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis oblique cordatis serratis superne scaberrimis. Loti arboris folio august. arbor baccifera. *Sloan.* h. 2. p. 80.
Muntingia folio ulmi aspero. *Plum. gen.* p. 47. ?
India occidentalis. ♄.

ROCHEFORTIA. (XLIII.)

Calyx 5-partitus.
Cor. infundibuliformis, fauce aperta.
Peric. 2-loculare, polyspermum.
(post *Schreberam.*)

cuneata. 1. R. foliis cuneiformibus obovatis integris.
ovata. 2. R. foliis ovatis emarginatis.
Jamaica. ♄. ♄.

DICHONDRA. Forst. (XLV.)

Calyx 5-partitus. *Cor.* rotata, 5-partita.
Capsulæ duæ.
(inter *Namam & Hydroleam.*)

sericea. 1. D. foliis subtus sericeis.
Jamaica. ☉.

HYDROLEA.

trigyna. 2. H. spinosa, foliis oblongis hirsutis, floribus trigynis axillaribus. * Campanula americana spinosa & hirsuta, flore patulo & sessili cæruleo. *Houst. msc.*
India occidentalis.

HYDROCOTYLE.

hirsuta. 3–4. H. hirsuta, foliis reniformibus lobatis crenatis, floribus verticillatis verticillis quadrifloris.
Hispaniola.

PANAX.

attenuata. 1–2. P. foliis 3-natis 5-natisve, foliolis ovatis attenuatis crenatis, caudice arborescente. *
India occidentalis. ♄.

TRIGYNIA.

VIBURNUM.

villosum. 2–3. V. foliis integerrimis ovatis, subtus incano-villosis.
Jamaica. ♄.

STA-

STAPHYLEA.

occidentalis. 1–2. S. foliis duplicato pinnatis, capſulis 3-gonis, ſeminibus ſolitariis, caule arboreo. *Sloan. h.* t. 220. f. 1. *Pluk. mant.* t. 269. f. 1. *Jamaica* ♄.

EVOLVOLUS.

ſericeus. 4–5. E. foliis lanceolatis ſesſilibus ſubtus ſericeis, pedunculis brevibus unifloris. Convolvolus erectus herbaceus ſubhirſutus, foliis linearibus, pedunculis brevibus. *Brown. jam.* 153. 3. t. 10. f. 3. *Jamaica.*

PENTAGYNIA.

ARALIA.

capitata. 1–2. A. arborea, foliis ſimplicibus ellipticis integerimis, paniculis terminalibus, floribus ſesſilibus capitatis. *Jacq. am.* 89. 2. t. 61. *India occidentalis.* ♄.

ſciodaphyllum. 3–4. A. arboreſcens, petiolis pedatis, foliis umbellatis terminalibus petiolatis, foliolis aliis centralibus, ſpicis longisſimis nutantibus. Sciodaphyllum. *Brown. jam.* 195. t. 19. f. 1. 2. *Jamaica.* ♄.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

HEPETIS. (X)

Calyx 3-partitus. *Cor.* 3-petala.
Capſula ſemiſupera, 3-locularis.
Sem. mutica.
(inter *Tillandſiam* & *Burmanniam.*)

anguſtifolia. 1. HEPETIS.
Jamaica.

BROMELIA.

bracteata. 4-5. B. foliis ſerrato-ſpinoſis, bracteis ovato-lanceolatis, ſcapo elongato, racemo compoſito, racemulis ſubdiviſis floribus ſeſſilibus. Aloë americana arboribus adnaſcens. *C. mſc.* 35. *fig.*
Jamaica. ♃.

paniculigera. 4-5. B. foliis ſerrato-ſpinoſis, bracteis lanceolatis, racemo compoſito, racemulis ſubdiviſis, floribus pedunculatis.
India occidentalis. ♃.

TILLANDSIA.

faſciculata. 5-6. T. ſpicis imbricatis lateralibus diſtichis, foliis lanceolato-ſubulatis erectis ſtrictis. *fig. Plum.*
Jamaica. ♃.

nutans. 5-6. T. ſcapo ſubnudo, panicula nutante, foliis radicalibus ovato-lanceolatis membranaceis.
Jamaica. ♃.

flexuoſa. 5-6. T. ſcapo ſubdiviſo, ſpicis laxis flexuoſis, ſpiculis diſtichis remotiuſculis, foliis lineari-lanceolatis reclinatis. *Jacq. am.* 92. t. 63. (Tillandſia tenuifolia.)
Jamaica. ♃.

cane-

canescens. 7-8. T. foliis linearibus erectis caulem æquantibus incanis; spicis subternis.
Jamaica. ♃.

angustifolia. 7-8. T. foliis lineari-lanceolatis rectis glabris, caulem superantibus, spicis sparsis fasciculatis.
Jamaica. ♃.

TRADESCANTIA.

monandra. 4-5. T. diffusa, foliis ovatis acuminatis, floribus monandris umbellulatis, involucello 4-phyllo.
Hispaniola. ⊙.

multiflora. 4-5. T. erecta, ramosa, foliis cordatis margine vaginisque ciliatis, pedunculis congestis, floribus umbellatis 3-andris.
Jamaica.

cordifolia. 4-5. T. repens, lævis, foliis cordatis, pedunculis elongatis multifloris.
Jamaica. ⊙.

Zanonia. 1-2. T. erecta, lævis, pedunculis solitariis geniculatis multifloris. Commelina Zanonia. *Linn.*

Spathacea. 7-8. T. acaulis, foliis sessilibus, scapis radicalibus.
India occidentalis, Campechia. ♃.

PONTEDERIA.

azurea. 2-3. P. foliis subrotundo-ellipticis, basi incrassatis, floribus spicatis. * Pontederia 1. *Brown. jam.* 195.
Jamaica.

limosa. 3-4. P. foliis cordato-ovatis, spathis lateralibus unifloris, floribus triandris. Nymphææ affinis planta palustris aqvatica, flore hexapetalo stellato cæruleo. *Sloan. jam.* h. I. t. 149. f. 1.
Jam. Hispaniola.

THRINAX.

PALMA. *Cal* 6-dentatus. *Cor.* nulla.
Stigma emarginatum. *Bacca* 1-sperma.
(pone *Calamum.*)

parviflora. 1. THRINAX. Corypha 1. *Brown. jam.* 190.
Jamaica, Hispaniola. ♄.

COCOS.

acicularis. 4. C. ſpinoſa tota, caudice frondibus foliolisque: ſpinis ſetaceis.
Palma pinnis inferne vaginantibus, caudice tereti aculeatisſimo. *Brown. jam.* 343. 4. Palma ſpinoſa minor caudice gracili. *Sloan.* h. II. 124.
India occidentalis, Jamaica. ♄.

PRINOS.

montana. 3. P. foliis ovatis margine ſerratis, floribus hexandris, pedunculis axillaribus.
Jamaica ♄.

ſideroxyloides. 4. P. foliis ſubrotundis integerrimis. *
Montſerrat. ♄.

LORANTHUS.

emarginatus. 5–6. L. racemis axillaribus ſimplicibus, foliis cuneatis ovatis emarginatis.
Hiſpaniola. ♄.

parvifolius. 8–9. L. pedunculis axillaribus trifidis, pedicellis unifloris, foliis ovatis integris.
Jamaica. ♄.

pauciflorus. 8–9. L. pedunculis trichotomis foliis brevioribus, foliis obovatis.
Jamaica. ♄.

HILLIA. LINN. (XXX.)

Calyx dupplex: *inferus* 6-phyllus.
Corolla longisſima, contorta.
Capſula 2 locularis, 2-valvis, coronata.
Semina pappoſa.

tetrandra. 2. H. corollis quadrifidis tetrandris, laciniis ovatis, foliis obovatis.
Jamaica. ♄.

longiflora. 1. H. *corollis 6-fidis, laciniis lanceolatis revolutis, foliis ovatis acutis.* Hillia Paraſitica. *Linn. Jacq.*

GUE-

GUETTARDA.

rugosa. 2. G. foliis ſubcordatis ovatis acutis, ſubtus tomentoſis ſuperne ſcabris, floribus hexandris.*
India occidentalis. ♄.

elliptica. 3. G. foliis ellipticis pubeſcentibus, floribus tetrandris.
Jamaica. ♄.

membranacea 4. G. foliis ovatis acuminatis membranaceis, ſubhiſpido-ſcabris, floribus tetrandris.
Dommingo. ♄.

TRIGYNIA.

SMILAX.

oblongata. 4–5. S. caule aculeato angulato, foliis oblongis acuminatis glabris trinerviis, nervis ſubtus aculeatis.
India occidentalis. ♄.

RAJANIA.

anguſtifolia. 2–3. R. foliis lineari-lanceolatis, baſi rotundatis.
Hiſpaniola. ♄.

ovata. 2–3. R. foliis ovatis acuminatis trinerviis.
Hiſpaniola.

CLAS-

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

PISONIA.

ſubcordata. 1–2. P. inermis, foliis cordato-ſubrotundis, fructibus ſiccis ſubclavatis 5–gonis, angulis apice muricatis. *
India occidentalis, *Antigua*. ♄.

nigricans. 1–2. P. inermis, foliis ovatis acuminatis, floribus cymoſis erectis, fructibus baccatis.
Piſonia inermis. *Jacq.* 275. 2.
Jamaica. ♄.

coccinea. 1–2. P. inermis, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis terminalibus laxis, floribus nutantibus, fructibus baccatis.
Hiſpaniola. ♄.

CLAS-

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

RHEXIA.

leucantha. 6. R. foliis oppositis cartilagineo-denticulatis coriaceis nitidis; ramulis tetragonis, floribus terminalibus decandris.
Jamaica. ♄.

purpurea. 7. R. foliis oppositis denticulatis coriaceis, ramulis teretibus, floribus axillaribus decandris.
Jamaica. ♄.

HYPELATE. Brown.

POLYGAM. *Calyx* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Stigma deflexum, trigonum.
Drupa monosperma.
(pone *Melicoccam.*)

trifoliata. 1. HYPELATE. *Brown. jam.* 207. 1.
Cytisus arboreus, foliis obtusis glabris, foliorum — *Sloan.* h. 2. 33.
Jamaica. ♄.

CUPANIA. Linn. (XXIII. c.)

Calyx 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Petala apice cucullata.
Stylus trifidus.
Capsula 3-locularis. *Sem.* solitaria.
(ante *Alophyllum.*)

tomentosa. 2. C. foliis pinnatis obovatis retusis inferne ferrugineo-tomentosis. Trigonis tomentosa.
Jacq. am. 102. 1.
Hispaniola. ♄.

glabra. 3. C. foliis pinnatis ovatis obtusis crenatis glabris.
Cupania. *Brown. jam.* 178.
Jamaica. ♄.

sapo-

Saponarioides. 4. C. foliis pinnatis oblongis integris, subtus scabris. *
India occidentalis. ♄.

ALOPHYLLUS.

rigidus. 2. A. foliis simplicibus denticulato spinosis, floribus racemosis.
Hispaniola. ♄.

racemosus. 3. A. foliis ternatis, floribus racemosis.
Hispaniola. ♄.

Cominia. 4. A. foliis ternatis, floribus paniculatis.
Rhus comminia. *Linn.* Baccifera indica 3-folia, fructu rotundo 1-pyreno. — *Sloan.* h. 2. 100. t. 208. f. 1.
Jamaica. ♄.

HEDWIGIA.

Calyx 4-dentatus. *Cor.* 4-fida.
Stylus nullus.
Capsula tricocca. *Sem.* nux.
(Inter *Guaream* & *Amyridem.*)

balsamifera. 1. HEDWIGIA.
Bois cochon. *Nicols. Hist. St. Doming.* 169.
Hispaniola. ♄.

FUCHSIA.

involucrata. 5. F. floribus involucratis.
Jamaica. ♄.

VACCINIUM.

meridionale. 12-13. V. floribus racemosis, foliis ovatis crenato-serratis sempervirentibus, caule arboreo.
Jamaica. ♄.

DIOSPYROS.

tetrasperma. 6. D. foliis membranaceis nitidis cuneiformibus, baccis tetraspermibus.
Jamaica. ♄.

DAPH-

DAPHNE.

Lagetta. 10–11. D. ſpicis paniculatis terminalibus, foliis ovatis acutis. *Brown. jam.* 371. t. 31. f. 5. Laurifolia arbor. *Sloan. h.* 2. 22. t. 168. 1. 2. 3. 169. 1. Bois dentelle. *Nicolſ. Doming.* 172. t. 1. f. 1, 2, 3, 4, 5.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

tinifolia. 11–12. D. racemis compoſitis erectis, floribus terminalibus confertis foliis oblongis. Laurus americana. *Mill.*
Jamaica. ♄.

occidentalis. 11–12. D. pedunculis axillaribus, floribus terminalibus umbellulatis dioicis, foliis alternis lanceolatis glabris.
Jamaica. ♄.

VALENTINIA:

Calyx 5-partitus, coloratus, patens.
Corolla nulla.
Capſula baccata, 1-locularis 4-ſperma.
(pone *Dodonæam.*)

Ilicifolia. 1. VALENTINIA.
Malpighia aqvifolii amplioribus foliis. *Plum. ic.* 167. t. 2.
Ilex, foliis aqvifolii americana. *Pluk. phyt.* 196. f. 3.
Hiſpaniola, Cuba. ♄.

DIGYNIA.

WEINMANNIA.

hirta. 1–2. W. foliis pinnatis; foliolis ovatis ſerrato-crenatis, ſubtus racemisque hirſutis.
Windmannia. *Brown. jam.* 212.
Jamaica. ♄.

TE-

TRIGYNIA.

COCCOLOBA.

nivea. 3-4 C. foliis ellipticis acuminatis venosis supra nitidis, racemis erectiusculis. C. nivea *Jacq. am.* 115. t. 78.
Jamaica, Hispaniola. ♄.

PAULINIA.

Vesperti-lio. 12-15. P. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis incisis, petiolis nudis, capsulis pedicellatis, alis horizontalibus lanceolatis. *
India occidentalis. ♄.

divaricata. 9-10. P. foliis 2-ternatis, foliolis ovatis acutis subintegris, petiolis nudis, paniculis divaricatis, alis capsularum ovatis.
Jamaica. ♄.

CARDIOSPERMUM.

grandiflorum. 3. C. foliis pubescentibus, capsulis acuminatis maximis laevibus.
Jamaica. ♄.

CLAS-

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

LAURUS.

montana. 4–5. L. foliis 3-plinerviis ovato-acuminatis perennantibus, floribus racemoſo-paniculatis. *Jamaica.* ♄.

exaltata. 11–12. L. foliis ovato-lanceolatis venoſis coriaceis perennantibus pla is; racemis erectis compoſitis, calyce cyathiformi perſiſtente. *Jamaica.* ♄.

triandra. 11–12. L. foliis lato-lanceolatis perennantibus planis; floribus triandris, fructu calyce tecto. *Jamaica.* ♄.

coriacea. 11–12. L. foliis ovatis acuminatis planis venoſis nitidis coriaceis, racemis erectis foliis brevioribus. *Jamaica.* ♄.

Leucoxylon. 11–12. L. foliis oblongo-lanceolatis planis perennantibus, racemis foliis brevioribus, calycibus incraſſatis verrucoſis. Laurus *Brown. jam.* 214. 2. *Jamaica.* &c. ♄.

membranacea. 11–12. L. foliis oblongis acuminatis venoſis convexis coriaceo-membranaceis, ramis racemiſque erectis, folio brevioribus. *Jamaica, Hiſpaniola.* ♄.

patens. 11–12. L. foliis ovato-lanceolatis planis membranaceis, racemis erectis diffuſis foliis longioribus. *Jamaica.* ♄.

pendula. 11–12. L. foliis oblongis venoſis membranaceis perennantibus, racemis laxis, fructubus pendulis, calycibus deciduis. Laurus. 3. *Brown. jam.* 214. ♄.

floribunda. 11–12. L. foliis ovato-lanceolatis planis membranaceis, floribus racemoſo-paniculatis laxis terminalibus. *Jamaica.* ♄.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

SOPHORA.

monosperma. 3-4. S. foliis impari-pinnatis, pinnis 5-jugis; leguminibus monospermis, caule arboreo. Glycine 3. *Brown. jam.* 298.
India occidentalis. ♄.

BAUHINIA.

porrecta. 7-8. B. floribus sub-10-dris; foliis cordatis, lobis porrectis acutis trinerviis, petalis lanceolatis. Bauhinia non aculeata folio ampliori & bicorni. *Plum. gen.* 23. *ic.* 32. t. 44. f. 2. Bauhinia. 1. *Brown. jam.* Sennæ spuriæ — *Sloan.* j. 150. h. 2. 51.
Jamaica, Hispaniola. ♄.

CASSIA.

sericea. 10-11. C. foliis sub 4-jugis ovatis hirsutis, glandula subulata inter foliolos, pedunculis 4-floris, leguminibus 4-gonis. C. sericea. *Mill. dict.*
Jamaica.

lineata. 14-15. C. foliis 5-jugis oblongiusculis subtus pubescentibus æqvalibus, glandula obsoleta sub infimis; pedunculis unifloris.
Jamaica. ♄.

virgata. 28-29. C. foliis decemjugis ovato-lanceolatis villosis, glandula petiolari pedicellata; pedunculis unifloris fol. longioribus.
Jamaica.

TRI-

TRICHILIA.

spondioides. 1-2. T. foliis impari-pinnatis subhirsutis, pinnis sub-10-jugis, inferioribus majoribus, racemis axillaribus. T. spondioides. *Jacq. am.* 128. *Sloan* h. 2. 103. t. 210. 2. 3. *Jamaica, Hispaniola.* ♄.

pallida. 2-3. T. foliis impari pinnatis membranaceis, racemis axillaribus terminalibusque, floribus octandris, filamentis villosis, capsulis 2-valvibus. *Hispaniola.* ♄.

moschata. 2-3. T. foliis pinnatis, pinnis alternis, racemis compositis, floribus sub 10-dris 1-petalis, fructubus 1-spermis. Laurus folio breviore, flore racemoso minore — *Sloan*. h. 2. p. 21. t. 166. f. 2. *Jamaica.* ♄.

MELIA.

sempervirens. 1-2. M. foliis bipinnatis, foliolis rugosiusculis subseptenis. M. Azedarach. b. *Linn.*

OCHNA. Linn. (LII.)

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Antheræ subsessiles.
Drupæ receptaculo incrassato subrotundo carnoso insertæ.
(inter *Quassiam* & *Fagoniam.*)

nitida. 2. O. calycibus corollæ æqualibus, drupis receptaculo superimpositis, foliis ellipticis serratis. *India occidentalis.* ♄.

Iabotapita. 1. O. *petalis calyce 3-plo majoribus, drupis receptaculo immersis.* O. Iabotapita. *Linn.*

QUASSIA.

excelsa. 2-3. Q. floribus hermaphroditis 5-dris paniculatis; foliis impari-pinnatis, foliolis oppositis, petiolatis, petiolo nudo. *Jamaica.* ♄.

TERMINALIA.

latifolia. 1-2. T. foliis obovatis subserratis, drupis carnosis. Arbor maxima, forte prunifera. *Sloan. hist.* 130.
Jamaica. ♄.

arbuscula. 1-2. T. foliis ovato-lanceolatis integris pubescentibus, ramis dichotomis, racemis erectis.
Jamaica. ♄.

SAMYDA.

tomentosa. 4-5. S. floribus octandris, (*Casearia*) foliis ovatis serratis subtus tomentosis.
Jamaica. ♄.

villosa. 2-3. S. floribus decandris, (*Samyda*) foliis oblongis subserratis basi obliqvis sericeis subtus villosis; pedunculis solitariis axillaribus.
Jamaica. ♄.

glabrata. 2-3. S. floribus decandris, foliis ovato-lanceolatis integris nitidis, pedunculis axillaribus unifloris.
Jamaica. ♄.

spinescens. 3-4. S. floribus decandris terminalibus, foliis lanceolato-ovatis obtusis crenatis glabris, ramis patulis spinescentibus.
Hispaniola. ♄.

MELASTOMA.

* *Decandræ, foliis trinerviis.*

procera. M. arborea, foliis trinerviis subdenticulatis glabris; racemo terminali, spicis simplicibus erectis, calycibus truncatis.
Melastoma foliis oblongis etc. *Plum. ic.* 142. f. 1.
Jamaica. ♄.

patens. M. fol. 3-nerv. subdenticulatis cordatis hirsutis; racemo terminali patulo, floribus distinctis dodecandris. M. umbellata. *Mill. dict.*
Jamaica. ♄.

rigida. M. fol. 3-nerv. ſubdenticulatis ovatis ſubcordatis rigidis poſtice ſcabris; paniculis terminalibus ferrugineo-hirſutis.
Jamaica. ♄.

quadrangularis. M. fol. 3-nerv. integris, ovato-lanceolatis glabris nervis coloratis, ramis quadrangularibus; racemo ſtricto terminali.
Jamaica. ♄.

ſcandens. M. fol. 3-nerv. denticulatis ovatis acutis glabris, racemo terminali, ſpicis ſubſecundis; caule ſcandente.
Jamaica. ♄.

montana. M. fol. 3-nerv. denticulatis oblongis acutis glabriuſculis, racemo terminali ſpicis patulis, petalis retuſis, calyce truncato.
Jamaica. ♄.

ornata. M. fol. 3-nerv. integris rigidis ſupra hiſpidis, ſetis adpresſis ſubtus incanis; umbellis 4-fidis terminalibus paucifloris, capſulis hiſpidis. *
Jamaica. ♄

trinervia. M. fol. 3-nerv. absque marginali, oblongis baſi apiceque attenuatis integris, utrinque glabris tenuioribus; racemis ſimpliciuſculis terminalibus.
Jamaica. ♄.

ramiflora. M. fol. 3-nerv. integris ovato lanceolatis ſcabriuſculis; ramis floriferis, floribus pedunculatis ſubconfertis.
Jamaica. ♄.

**.) *Decandræ, triplinerviæ.*

praſina. M. fol. 3-plinerviis integerrimis lato-lanceolatis glabris, panicula terminali patentisſima.
M. lævigata. *Aubl. guian.* c. *fig.*
Jamaica, Hiſpaniola etc. ♄.

****) Decandræ, 5 nerviæ.*

argentea. M. foliis 5-nerviis sub denticulatis ovatis glabris, inferne tomentosis candidis; paniculis terminalibus patentibus.
Grossularia fructu arbor maxima etc. *Sloan.* H. 2. 84. t. 199. f. 1.
India occidentalis. ♄.

elata. M. fol. 5-nerv. serrato-denticulatis oblongis coriaceis, subtus ferrugineo-tomentosis; paniculis terminalibus patentibus, floribus sessilibus.
Jamaica. ♄.

Tamonea. M. fol. 5-nerv. oblongo-lanceolatis acutis integris, subtus tomentoso-incanis; racemis compositis terminalibus, racemulis brachiatis, bracteis geminis floribus subjectis.
Tamonea gvianensis. *Aubl.* *gvian.* 441. t. 175. Grossulariæ fructu arbor maxima — *Sloan.* H. 2. p. 84. *Pluk. phyt.* t. 264. f. 4.
India occidentalis. ♄.

albicans. M. fol. 5-nerv. integris ovatis acutis supra glabris, inferne tomentosis albido-ferrugineis; racemis terminalibus erectis, floribus confertis sessilibus.
Jamaica. ♄.

impetiolaris. M. fol. 5-nerv. denticulatis subsessilibus oblongis acuminatis coriaceis subtus tomentoso-ferrugineis; paniculis terminalibus axillaribusque erectis.
India occidentalis. ♄.

splendens. M. fol. 5-nerv. integris oblongis acuminatis utrinque glabris, superne nitidis; paniculis terminalibus erectis.
Melastoma foliis ovatis, etc. *Plum. ic.* 140.
Hispaniola. ♄.

coriacea. M. fol. 5-nerv. cartilagineo-denticulatis ovatis rugosis glabris coriaceis, ramis petiolisque strigosis, ramis paniculæ tetragonis. *
Montserrat. ♄.

strigi-

strigillosa. M. fol. 5-nerv. subdenticulatis subcordatis acuminatis, superne strigoso-pilosis subtus tomentosis; racemis axillaribus solitariis floribus pedicellatis confertis.
India occidentalis. ♄.

**** *Octandræ, foliis trinerviis.*

fascicularis. M. foliis 3-nerviis integris ovatis acutis scabris, ramis floriferis, floribus breviter pedunculatis confertis.
Jamaica. ♄.

angustifolia. M. foliis 3-nerviis lineari-lanceolatis integris subtus incanis, ramis virgatis; paniculis terminalibus, floribus erectis.
India occidentalis. ♄.

micranthus. M. fol. 3-nerviis denticulatis oblongis acutis glabris; racemis axillaribus reclinatis, floribus acuminatis.
Jamaica. ♄.

capillaris. M. fol. 3-nerviis subdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis glabris; pedunculis capillaribus trifloris axillaribus.
Jamaica. ♄.

rubens. M. fol. 3-nerviis denticulatis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, ramis petiolisque coloratis; racemo terminali, floribus confertis dioicis. Melastoma. 8. *Brown. jam.* 219.
Jamaica. ♄.

purpurascens. M. fol. 3-nerviis integris oblongis acutis striatis glaberrimis; racemis lateralibus patulis, floribus distinctis.
Jamaica. ♄.

glabrata. M. fol. 3-nerviis subdenticulatis ovatis acutis glabris coriaceis; pedunculis terminalibus solitariis unifloris.
Jamaica. ♄.

alpina. M. fol. 3-nerviis integris ovatis coriaceis glabris; pedunculis simpliciter trichotomis; floribus distinctis.
India occidentalis. ♄.

hirsuta. M. foliis 3-nerviis subdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis hirsutis; pedunculis axillaribus trifloris divaricatis.
Jamaica. ♄.

hirtella. M. fol. 3-nerviis, margine hispido-pilosis, pedunculis brevissimis axillaribus trifloris.
Jamaica. ♄.

microphylla. M. fol. 3-nerviis subdenticulatis ovatis obtusis superne hispidis infra tomentosis; pedunculis trifidis axillaribus. *
India occidentalis. ♃.

tetrandra. M. fol. 3-nerviis integris oblongis acuminatis basi emarginatis glabris convexiusculis; racemo erecto terminali, floribus tetrandris.
Jamaica. ♄.

***** *Octandræ, triplinerviæ.*

virgata. M. fol. 3-plinerviis integris ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis; ramis floriferis, racemis decussatis diffusis sparsis.
Jamaica. ♄.

Eleagnoides. M. fol. 3-plinerviis integris lato-lanceolatis subtus albido-tomentosis; pedunculis terminalibus trichotomis, floribus solitariis. *
India occidentalis. ♄.

****** *Octandræ, 5-nerviæ.*

umbrosa. M. foliis 5-nerviis denticulatis lato-ovatis acuminatis utrinque hirtis; ramulis floriferis, racemis dichotomis patentibus; ramis petiolisque hirsutis.
St. Christoffer. ♄

pilosa. M. fol. 5-nerviis denticulatis oblongis acutis subtus hirsutis; racemis lateralibus hirsutis.
Jamaica ♄.

hispida. M. fol. 5-nerviis subdenticulatis ovatis acutis, superne strigoso-hirsutis subtus reticulato-tomentosis, paniculis terminalibus divaricatis.
India occidentalis. ♄.

aqua-

aquatica. M. foliis 5-nerviis cordatis acutis crenulatis, superne hirtis subtus lævibus; paniculis terminalibus trichotomis diffusis. *
M. aqvatica. *Aubl. gvian.* p. 430. t. 169.
India occidentalis. ♄.

PETALOMA.

Calyx cyathiformis 5-dentatus.
Petala 5 calyci inter dentes inserta.
Bacca 1-locularis 1-4-sperma.
(inter *Murrayam* & *Melastomam.*)

myrtilloides. 1. P. pedunculis solitariis unifloris, foliis subsessilibus ovatis attenuatis basi obliquis.
Myrti folio etc. *Sloan. Hist.* 2. p. 78. t. 187. f. 3.
India occidentalis. ♃.

Mouriri. 2. P. pedunculis corymbosis axillaribus, foliis petiolatis ovatis acuminatis, baccis 4-spermibus. *
Mouriri gvianensis. *Aubl. gvian.* 452. t. 180.
Gviana. ♄.

ANDROMEDA.

fasciculata. 5-6. A. pedunculis aggregatis, corollis .... foliis alternis ovato-lanceolatis obtusis subcrenulatis coriaceis.
Jamaica. ♄.

Jamaicensis. 5-6. A. pedunculis aggregatis, corollis ovatis diaphanis; foliis alternis lato-lanceolatis obtusis integris, subtus cinereis membranaceis.
Jamaica. ♄.

octandra. 5-6. A. pedunculis aggregatis, corollis cylindricis 4-fidis; foliis alternis ovato-lanceolatis integris membranaceis.
Jamaica. ♄.

EPIGÆA.

cordifolia. 2. E. foliis cordatis subrotundis serratis convexis hispidis rigidis, corollis ovatis. *
Guadeloupe. ♄.

repens. 1. E. *foliis cordato-ovatis integris planis asperis; corollis cylindricis.* E. repens. *Linn.*

CLETHRA.

trifolia. 2. C. arborea; foliis oblongo-lanceolatis integerrimis subtus incanis; racemis paniculatis spicæformibus tomentosis.
Tinus occidentalis. *Linn.* Volkameria. *Brown. jam.* 214. t. 21. f. 1. *Sloan. Hist.* 2. 86. t. 198. f. 2.
Jamaica. ♄.

Alnifolia. 1. C. *fruticosa, foliis obovato-lanceolatis serratis glabris, racemis simplicibus spicæformibus.* C. alnifolia. *Linn.*

STYRAX.

glabrum. 2. S. foliis oblongis subserratis utrinque glabris; pedunculis axillaribus simplicibus confertis multifloris, floribus nutantibus.
India occidentalis, Vincenti. ♄.

officinalis. 1. S. *foliis ellipticis integris subtus tomentosis.* S. officinalis. *Linn.*

TRIGYNIA.

MALPIGHIA.

faginea. 3–4. M. foliis oblongo-ovatis integris subtus sericeo-nitidis; pedunculis 3-partito-umbellatis. *
India occidentalis., ♄.

lucida. 3–4. M. foliis obovatis cuneiformibus integerrimis enerviis nitidis, pedunculis terminalibus multifloris. *
India occidentalis. ♄.

coriacea. 6–7. M. foliis ovatis acutis integris utrinque glabris; racemis terminalibus spicatis.
Malpighia. 6. *Brown. jam.* Tiliæ affinis laurifolia — *Sloan. jam.* h. 2. 163. f. 1.
Jamaica. ♄.

BANI-

BANISTERIA.

longifolia. 3-4. B. foliis oblongis acuminatis rigidis nitidis, panicula terminali, ramis patentissimis.
India occidentalis. ♄.

TRIOPTERIS.

Citrifolia. 2. T. foliis oblongis integris utrinque glabris; racemis axillaribus ramis dichotomis, capsulis 4-alaribus.
Acer scandens tricoccos fol. citri. *Plum. ic.* t. 16.
Jamaica. ♄.

rigida. 3. T. foliis subrotundis acutis marginatis lineatis coriaceis; racemis compositis axillaribus, capsulis trialatis.
Hispaniola. ♄.

ERYTHROXYLON.

squamatum. 3. E. foliis ovatis acuminatis, ramulis squamosis, drupis acutis.
India occidentalis. ♄.

CLAS-

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

TRIUMFETTA.

rhombeæfolia. 3–4. T. foliis rhomboideis, summis lanceolato-ovatis; floribus completis.
T. rhomboidea. *Jacq. am.* 147. t. 90.
India occidentalis. ♄.

LYTHRUM.

cordifolium. 8–9. L. foliis oppositis subsessilibus cordatis acutis scabris, racemis terminalibus axillaribusque, floribus decandris.
Hispaniola. ♄.

ciliatum. 8–9. L. foliis oppositis petiolatis ovatis glabris, margine ciliatis; racemis terminalibus, floribus subsecundis decandris.
Jamaica. ♄.

TRIGYNIA.

EUPHORBIA.

glabrata. 13–14. E. inermis, frutescens ramosa, foliis oppositis ovatis acutis glabris integerrimis.
Peplis fruticosa marittima geniculata. *Sloan.* h. 2. 198.
Jamaica. ♄.

obliterata. 33–34. E. umbella trifida; foliis oblongis trapezoideis serratis pubescentibus, altera baseos parte obliteratis. E. obliterata. *Jacq. am.* 151. 5.
Jamaica. ♄.

punicea. 51–52. E. umbella 5-fida, trifida, involucellis ovalibus acuminatis coloratis, capsulis glabris; foliis lanceolato-cuneiformibus subtus glaucis.
Jamaica ♄.

CLAS-

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

CACTUS.

pendulus. 14–15. C. pendulus, ramis verticillatis teretibus glabris muricis. Casſytha polyſperma *Mill. ic.* C ctus. *Brown. jam.* 238. Viſcum.—*Sloan. h.* 2. p. 93.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

alatus. 22–23. C. prolifer, enſiformis compreſſus crenatus. Cactus 5. *Brown. jam.* 237. Opuntia non ſpinoſa. *Sloan. h.* 3. 159. 2.
Jamaica. ♄.

PSIDIUM.

montanum. 1–2. P. foliis oblongis acuminatis crenulatis nitidis, pedunculis multifloris.
Pſidium 2. *Brown. jam.* 238.
India occidentalis. ♄.

Guineenſe. 1–2. P. foliis ovatis integris ſubtus tomentoſis, pedunculis 3-floris.
Inſula principis Africes, in Domingo culta. ♄.

MYRTUS.

alpina. 1–2. M. pedunculis ſolitariis terminalibus unifloris breviſſimis; foliis ovatis, ramulis quaternis faſtigiatis, caule arboreo.
Jamaica. ♄.

procera. 1–2. M. pedunculis confertis axillaribus unifloris; foliis ovatis acuminatis planis glabris, ramis virgatis, caule arboreo.
Hiſpaniola. ♄.

buxi-

ligustrina. 1–2. M. pedunculis solitariis ramosisque terminalibus unifloris; foliis lanceolatis obtusis convexis lucidis.
Hispaniola. ♄.

crenulata. 1–2. M. pedunculis solitariis axillaribus sub 3-floris; foliis subrotundis crenulatis glabris.
Hispaniola. ♄.

lineata. 7–8. M. floribus axillaribus subsessilibus, foliis ovatis acuminatis rigidis lineatis subtus incanis.
Hispaniola. ♄.

cordata. 7–8. M. floribus axillaribus lateralibusque subsessilibus, foliis sessilibus cordatis ovatis nitidis.
India occidentalis ♄.

buxifolia. 7–8. M. racemulis brevissimis confertis axillaribus; foliis cuneatis oblongis obtusis convexiusculis.
India occidentalis. ♄.

glabrata. 7–8. M. racemulis brevissimis axillaribus multifloris; foliis ellipticis acuminatis convexis coriaceis glaberrimis.
Hispaniola. ♄.

disticha. 7–8. M. pedunculis axillaribus multifloris foliis brevioribus; foliis distichis deflexis ovato-lanceolatis, ramis patentibus.
Jamaica. ♄.

monticola. 7–8. M. pedunculis multifloris brevissimis axillaribus solitariis; foliis ovatis obtusatis planis glaberrimis.
Jamaica. ♄.

axillaris. 7–8. M. pedunculis multifloris brevissimis axillaribus confertis; foliis ovatis acuminatis nitidis planis.
Jamaica. ♄.

Gregii. 7–8. M. pedunculis multifloris axillaribus; foliis ovatis ellipticis acutis integerrimis subtus pubescentibus. ☼
India occidentalis, Antigua. ♄.

virgul-

virgultosa. 8.-11. M. pedunculis axillaribus terminalibusque paniculatis, pedicellis remotis decussatis unifloris; foliis lato-lanceolatis attenuatis, ramis virgatis, caule arboreo.
Myrtus fol. ovato-lanceolatis. *Plum. ic.* 208. f. 1.
Jamaica. ♄.

splendens. 8-11. M. pedunculis axillaribus solitariis trichotomis; foliis ellipticis acuminatis planis venosis scariosis nitidis, ramis virgatis.
Hispaniola. ♄.

acris. 13-14. M. pedunc. axillaribus terminalibusque corymbosis trichotomis foliis longioribus; foliis ellipticis convexis coriaceis venosis punctatis, caule arboreo. * M. caryophyllata. *Jacq. obs.* 2. 1. Caryophyllus. 1. *Brown. jam.* 247. *Pluk. alm.* 188. t. 155. f. 3.
b. *pedunculis trichotomis terminalibus; foliis subrotundo-ellipticis convexis coriaceis avenis punctatis utrinque nitidis.* Myrtus cotini folio. *Plum. ic.* t. 208. f. 2.
India occidentalis. ♄.

fragrans. 13-14. M. pedunculis axillaribus trichotomis simplicibusque; foliis ovatis convexiusculis subcoriaceis punctatis glabris, caule arboreo.
Eugenia montana. *Aubl. guian.* 495. t. 195.
Jamaica. ♄.

CALYPTRANTHES. (xix. a.)

Calyx truncatus, superus, operculo calyptriformi, deciduo. *Cor.* nulla.
Bacca monolocularis 1-4-sperma.
(pone *Myrtum.*)

Chytraculia. 1. C. arborea, pedunculis terminalibus paniculatis trichotomis tomentosis; foliis ovatis apice attenuatis. Myrtus Chytraculia. *Linn.*

Zuzygium. 2. C. arborescens, pedunculis axillaribus trichotomis patulis; foliis ovatis obtusis, ramis dichotomis. Myrtus zuzygium. *Linn.*

rigi-

rigida. 3. C. arborescens, pedunculis solitariis axillaribus subtrifloris; foliis ovatis acutis convexis aveniis rigidis.
Jamaica. ♄.

PRUNUS.

occidentalis. 3–4. P. floribus racemosis, racemis lateralibus; foliis perennantibus eglandulosis oblongis acuminatis integris, utrinque glabris.
India occidentalis. ♄.

sphaerocarpa. 3–4. P. floribus racemosis, racemis axillaribus; foliis sempervirentibus eglandulosis integris nitidis, drupis subrotundis.
Myrti folio arbor — *Sloan.* h. 2. p. 79. t. 193. f. 1.
Hispaniola. ♄.

CLAS-

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

TERNSTRŐMIA. L. (XXXVII. b.)

Cal. 5-partitus. *Cor.* monopetala urceolata, 5 partita.

Bacca ficca, polyfperma.

elliptica. 2. T. foliis ellipticis acutis integris, pedunculis lateralibus. ✿
India occidentalis, Guadeloupe, Vincentii. ♄.

meridionalis. 1. T. *fol. obovatis integris, pedunculis terminalibus.* T. meridionalis *Linn. fuppl.*
India occidentalis. ♄.

punctata. 3. T. foliis oblongis integris fubemarginatis margine punctatis, ped. axillaribus. ✿
Taonabo punctata. Aubl. gvian. 571. t. 228.

dentata. 4. T. foliis oblongis acuminatis dentato-ferratis, ped. axillaribus lateralibusque. ✿
Taonabo dentata. Aubl. gvian. 569. t. 227.
Gviana. ♄. ♄.

CAPPARIS.

torulofa. 7-8. C. pedunculis fubbifloris teretibus terminalibus, foliis lanceolato-ovalibus, fubtus albido-punctatis; filiquis teretibus linearibus torulofis. *Breynia* 2. *Brown. j.* 246.
Jamaica. ♄.

longifolia. 7-8. C. pedunculis —, foliis lineari-lanceolatis, fubtus farinofo-punctatis. *Pluk. am.* t. 327. f. 6.
Jamaica. ♄.

POSSIRA. Aublet. (XXV.)

Cal. 4-partitus.
Petalum unicum, laterale.
Legumen 1-loculare, 2-valve.

ſimplex. 1. P. foliis ſimplicibus oblongis.
Inſulæ caribeæ. ♄.

triphylla. 2. P. foliis ternatis, petiolis marginatis. ✱
Posſira arboreſcens *Aubl. gvian.* 934. t. 353.
Gviana, Cayenna. ♄.

SLOANEA. Linn.

Cor. nulla. *Cal.* 1-phyllus.
Antheræ filamentis infra apicem adnatæ.
Capſula echinata 3-6 loc. 3-6 valvis.
Sem. bina, arillo baccato.
(ante *Trewiam.*)

Masſoni. 2. S. foliis cordato-ellipticis, ſtipulis linearibus; calyce 5-partito, ſetis capſulæ longisſimis.✱
Inſulæ caribeæ, Chriſtoph. etc. ♄.

dentata. 1. S. *foliis ovatis acutis, ſtipulis cordato 3-angularibus ſerratis.* S. dentata. *Linn. Plum.*

ſinemarienſis. 3. S. foliis ſubrotundo - ovatis integris, capſulis ovatis ſetoſis ex apice dehiſcentibus. ✱.
S. ſinemarienſis *Aubl. gvian.* 354. t. 212.
Inſul. caribeæ, Chriſtoph. Gviana. ♄.

APEIBA. Marcg. Aubl. (XXXVII.)

Calyx 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Capſula multilocularis, echinata.
Loc. polyſperma.
(inter *Bixam & Sloaneam.*)

Tibourbou. 1. A. foliis acute-ſerratis hirſutis.
Apeiba Tibourbou. *Aubl. gvian.* 538. t. 213.
Sloanea *Loefl. it.* 311. Apeiba. *Marcgr. braſ.* 123. f. 124.
India occidentalis, Tobago, Gviana. ♄.

Petoumo. 2. A. foliis ellipticis acutis ſerrulatis ſubtus incanis. ✱ *Aubl. gvian.* 543. t. 215.

aſpera. 3. A. foliis integerrimis ſubtus pubeſcentibus, fructu compresſo. ✱ *Aubl. gvian.* 545. t. 216.

laevis. 4. A. foliis integerrimis, utrinque glabris; fructu aspero depresso. * *Aubl. gvian.* 541. t. 214.
Gviana. ♄. ♄. ♄. †).

LIGHTFOOTIA.

☿. *Calyx* 4-phyllus. *Cor.* nulla.
Stigma sessile. *Bacca* umbilicata, 1-locularis, 3-6-sperma.

♂. ♀. } Hermaphrodit.

(inter *Prockiam* & *Corchorum.*)

serrata. 1. LIGHTFOOTIA.
Montserrat. ♄.

LAETIA.

Guidonia. 12. L. floribus apetalis, pedunculis unifloris terminalibus, foliis oblongis acuminatis serratis pubescentibus.
Guidonia. *Brown. jam.* 249. t. 29. f. 4.?
Jamaica. ♄.

Thamnia. 1-2. L. floribus apetalis, pedunculis multifloris subdivisis axillaribus, foliis oblongis acutis subcrenatis nitidis. Thamnia. *Brown. jam.* 245.
Jamaica. etc. ♄.

ACIDOTON. (XXXVIII.)

DIOIC. MONOIC. }

♂. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla.
Stam. receptaculo globoso affixa.

♀. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* nulla.
Stylus 3-fidus. *Capsula* tricocca.

†). A. *petoumo, asperam* & *laevem* ex Aubletio mutuavi, characteribus specificis impositis secundum specimina Aubletii in Museo Banksiano asservata.

urens. 1. ACIDOTON.
Urtica urens arborea, foliis oblongis angustis. *Sloan. j.* 38. h. 1. p. 125. t. 83. f. 1.
Jamaica. ♄.

HEDYOSMUM.

MONOIC. ♂. *Amentum* antheris tectum.
Per. *Cor.* *Fil.* nulla.
♀. *Cal.* 3-dentatus. *Cor.* nulla.
Stylus unicus, triqueter.
Bacca trigona, monosperma.

nutans. 1. H. caule fruticoso, ramis laxis, foliis lanceolatis acuminatis.
Jamaica. ♄.

arborescens. 2. H. caule arborescente, ramis strictis erectis, foliis ovato-lanceolatis.
Jamaica. ♄.

MARILA. (XXXVII.)

Cal. 5 phyllus. *Cor.* 5-petala.
Capsula 4-locularis, polysperma.
Stigma simplex.
(inter *Laetiam* & *Elæocarpum.*)

racemosa. 1. MARILA. *
India occidentalis, Montserrat, Christoph. ♄.

LEGNOTIS. (XIX. b.)

Cal. 5-fidus. *Petala* 5 receptaculo inserta, lacera.
Capsula trilocularis.
(pone *Elæocarpum.*)

elliptica. 1. L. foliis ellipticis, floribus pedicellatis.
Jamaica. ♄.

Cassipourea. 2. L. foliis ovatis, floribus sessilibus. *
Cassipourea gyianensis. *Aubl.* gv. 529. t. 211.
Gviana. ♄.

ERO-

EROTEUM. (XXXVII. b.)

Calyx 5-phyllus. *Cor.* 5 petala. *Stylus* 3-fidus. *Bacca* exſucca, 3-locularis, polyſperma.

(pone *Theam.*)

Theæoides. 1. E. foliis ovato-lanceolatis ſerrato-dentatis, floribus axillaribus ſolitariis.
Jamaica. ♄.

undulatum. 2. E. foliis elliptico-lanceolatis acuminatis ſerratis, floribus confertis axillaribus. *
India occidentalis; Chriſtopher, Montſerrat, Guadeloupe etc. ♄.

MIMOSA.

alba. 1-2. M. inermis, foliis pinnatis 3-jugis, pinnis æqualibus ovatis acuminatis, petiolo ſubmarginato. *
Cayenna. ♄.

Laurina. 2-3. M. inermis, foliis pinnatis 2-jugis, pinnis ovatis nitidis ſubæqvalibus, petiolo lineari angulato, ſpicis axillaribus ſolitariis.
India occidentalis, Chriſtopher. ♄.

comoſa. 24-25. M. inermis, arborea, foliis 2-pinnatis 3-jugis, pinnis (9-10-jugis) ovalibus baſi retuſis, floribus paniculatis monadelphis.
Jamaica. ♄.

villoſa. 28-29. M. inermis, foliis 2-pinnatis ſub 5-jugis; pinnis ovatis petiolisque villoſis, floribus globoſis polyandris, caule fruticoſo.
India occidentalis. ♄.

mangenſis 30-31. M. ſpinis ſolitariis brevibus, foliis 2-pinnatis ſub 9-jugis, ſpicis globoſis axillaribus ſolitariis. M. mangenſis. *Jacq. am.* 267. 5.
India occidentalis, Jamaica ♄.

juliflora. 31-32. M. ſpinis ſtipularibus geminis, foliis 2-pinnatis 2-jugis glandula interſtinctis; ſpicis pendulis, leguminibus compreſſis.
Mimoſa. 2. *Brown. jam.* 251.
Jamaica. ♄.

TRIGYNIA.

HOMALIUM. Jacq. (XLII.)

Calyx 6-7-partitus. *Cor.* 6-7-petala.
Stam. 21 per tria aggregata.
Per. uniloculare, polyfpermum.
(ante *Delphinium.*)

racemofum. 1. H. foliis ferratis, racemis axillaribus terminalibusque, floribus pedunculatis. Homalium racemofum. *Jacq. am.* 170. t. 183. f. 72.
Jamaica. ♄.

Racoubea. 2. H. foliis dentatis coriaceis, racemis terminalibus, floribus fubfesfilibus. *
Racoubea gvianenfis. *Aubl. gvian.* p. 590. t. 236.
Gviana. ♄.

BEGONIA.

fcandens. 2. B. fcandens, radicans; foliis cordato-ovatis rectis obtufe ferratis, floribus paniculatis. Begonia glabra *Aubl. gvian.* 916. t. 349. 13. B. nivea maxima — *Plum. fp.* 21 *ic.* 45.
India occidentalis, Jamaica. ♃.

purpurea. 3. B. caulefcens, erecta; foliis cordatis ovato-lanceolatis, obfolete ferratis obliquis; floribus paniculatis.
B. obliqva. b. *Spec. plant. Plum. ic.* 45. f. 3. Rumex fylveftris fcandens — *Brown. jam.* 203.
India occidentalis. ♄.

POLYGYNIA.

MAGNOLIA.

Plumieri. 1–2. M. foliis perennantibus ovato-ſubrotundis utrinque glabris.* Magnolia. *Plum. gen. p.* 38. 7. *ic. not. Burm.* p. 161.
Lucia, Martinica, Gvadeloupe. ♄.

UVARIA.

lanceolata. 1–2. U. foliis lanceolatis integris floribus axillaribus ſolitariis, ramis virgatis. Arbor foliis ovatis. etc. *Brown. jam.* 370. 11.
Jamaica. ♄.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

TEUCRIUM.

inflatum. 15-16. T. foliis oblongis acuminatis inæqvaliter ferratis pubescentibus, spicis sessilibus terminalibus, calycibus inflatis villosis.
Teucrium. *Brown. jam.* 257.
India Occidentalis, Jamaica. ♃.

STACHYS.

patens. 6-7. S. ramosissima, ramis filiformibus patentibus, foliis lanceolatis ferratis glabris, floribus subverticillatis.
Hispaniola. ♄.

CLINOPODIUM.

capitatum. 2-3. C. foliis planis glabris, capitulis axillaribus pedunculatis. Clinopodium. 1, *Brown. jam.*
Melissa altissima globularia. *Plum. ic.* t. 163. f. 2.
Sideritis. *Sloan. jam.* 65. h. 1. p. 174. t. 109. f. 2.
Scabiosæ affinis. *Pluk. alm.* 355. t. 222. f. 7.
Hyptis. *Jacq. ic.*
Jamaica. ⊙.

PHLOMIS.

Martinicensis. 9-10. P. involucris setaceis, verticillis subglobosis, calycibus recurvis, lacinia sup. subulata longissima, foliis ovato-oblongis villosis. *
Jacq. ic. Clinopodium martinicense, *Jacq. am.* 160. t. 177. f. 75.
Martinica. etc.

THY-

THYMUS.

Brownei. 1–2. S. foliis orbiculatis crenatis, floribus pedunculatis axillaribus. Thymus 1. *Brown. jam.* 259.
Jamaica. ☉. ♃.

SCUTELLARIA.

purpurascens. 11–12. S. foliis petiolatis cordato-ovatis dentatis, racemis nudis terminalibus, corollis labio utroque trifido. *
Guadeloupe.

ANGIOSPERMIA.

GESNERIA.

Craniolaria. 3. G. foliis cuneatis oblongis dentato-laciniatis; pedunculis terminalibus, corollis campanulatis. Craniolaria fruticosa. *Linn.* Gesneria arborescens amplo flore — *Plum. gen.* 27. t. 137.
Hispaniola. ♄.

grandis. 3. G. foliis lato-lanceolatis longissimis denticulatis superne hirtis infra scabris; pedunculis terminalibus, caule arborescente.
Jamaica. ♄.

scabra. 3. G. foliis ovato-lanceolatis serratis scabris, pedunculis axillaribus, corollis cylindricis recurvis.
Jamaica. ♄.

corymbosa. 1–2. G. foliis ovatis acutis serratis scariosis asperis, pedunculis multipartitis, floribus corymbosis.
Jamaica. ♄.

exserta. 3. G. foliis ovato-lanceolatis crenatis glabris, pedunculis trifloris, genitalibus corolla duplo longioribus, capsulis ovatis.
Jamaica. ♄.

calycina. 3. G. foliis lanceolato-ovatis acuminatis serratis glabris, ped. 3-floris, genitalibus corolla longioribus, calycibus campanulatis, caps. cylindricis.
Jamaica. ♄.

ventricosa. 3. G. foliis ellipticis acuminatis crenatis glabris, ped. sub 4-floris, laciniis calycis subulatis elongatis, corollis ventricosis. *
Jamaica, Montserrat, Dominica. ♄.

pulchella. 3. G. herbacea, foliis ternatis ovatis acutis serratis villosis, pedunculis axillaribus unifloris. Achimenes 2. *Brown. jam.* 270. t. 30. f. 1.
Columnea erecta, *Lamarck. Encycl.* 2. p. 66. n. 2.
Jamaica. ⊙.

pumila. 3. G. acaulis, foliis ovato-cuneiformibus crenatis subsessilibus, ped. subbifloris foliis brevioribus.
Jamaica.

BRUNFELSIA. Linn. (xl.)

Calyx 5 dentatus. *Cor.* tubo longissimo. *Bacca* 1-locularis polysperma, *conceptaculo* maximo.
(póne *Besleriam.*)

undulata. 2. B. foliis lanceolato-ovatis utrinque attenuatis, petiolis brevissimis, corollis tubo curvo, limbo undulato.
Jamaica. ♄.

americana. 1. B. *foliis ellipticis acuminatis, petiolis longioribus, corollis tubo erecto, limbo integro.* Linn.
India occidentalis, Jamaica. ♄.

BIGNONIA.

longissima. 1-2. B. arborea, foliis simplicibus oblongis acuminatis, floribus 2-dris, siliquis filiformibus, seminibus lanatis. B. longissima *Jacq. am.* 182. t. 176. f. 78. *Plum. sp.* 5. *ic.* 57. Bignonia 2. *Brown. jam.* 264. Bignonia Qvercus *Lamarck Encycl.* 417. 2.
India occidentalis. ♄.

alliacea. 4-5. B. foliis conjugatis: foliolis ellipticis integris coriaceis, pedunculis 5-floris axillaribus, calycibus integris. *. B. alliacea *Aubl. gvian.* 659. 14. *Barr. Gall. æqvin.* 23.
India occidentalis. ♄.

echinata. 9-10. B. foliis inferioribus ternatis, superioribus conjugatis, petiolis dichotomis cirrhosis; fructibus echinatis. * B. echinata *Jacq.* h. 183. t. 176. f. 52. *Aubl. gvian.* 648. t. 263. 264.
India occidentalis. ♄.

CITHAREXYLON.

erectum. 1-2. C. ramis teretibus, racemis erectis terminalibus, calycibus dentatis. Citharexylon 5. *Brown. jam.* t. 28. f. 2.
Berberis fructu, arbor maxima — *Sloan.* h. 99. t. 206. f. 3. 4.
Jamaica. ♄.

subserratum. 4. C. ramis 4-gonis, racemis axillaribus nutantibus, calycibus dentatis, foliis ellipticis subserratis venosis.
Hispaniola. ♄.

melanocardium. 4. C. ramis tetragonis, racemis terminalibus compositis, floribus tetrandris.
Citharexylon 2. *Brown. jam.* 265.

TANÆCIUM. (XXV.)

Calyx cylindraceus, truncatus.
Corolla tubulosa, subæqvalis, 5-fida.
Rudimentum filamenti 5 ti.
Bacca corticosa maxima.
(ante *Cal.* 2*fidos.*)

Iarobu

Iaroba. 1. T. foliis inferioribus ternatis, superioribus geminatis, cirrhis interpetiolaribus terminalibus; caule scandente. Iaroba. *Marcgr. bras.* 25. *Pis.* 173. Crescentia? 6. *Brown. jam.* 266. Cucurbitifera fruticosa 3-folia. *Sloan. jam.* 207. h. 2. p. 175.
Jamaica. ♄.

parasiticum. 2. T. foliis ovatis coriaceis, caule scandente fruticoso radicante. Crescentia? 5. *Brown. jam.* 265.
Jamaica. ♄.

LANTANA.

stricta. 3-4. L. foliis oppositis oblongo-lanceolatis acutis, caule inermi; capitulis subrotundis, bracteis ovato-lanceolatis squarrosis.
Periclymenum rectum salviæ folio. *Sloan.* h. 2. 84. t. 195. 4.
Jamaica. ♄.

radula. 3-4. L. foliis oppositis ovatis acutis serratis rugosis asperis, subtus hirsutis, caule subinermi aspero; capitulis oblongis, bracteis ovatis acutis.
India occidentalis. ♄.

LINDERNIA.

dianthera. 2. L. foliis petiolatis ovato-subrotundis subserratis, caule repenti. Erinus procumbens. *Mill. dict.*
Hispaniola. ☉.

BUCHNERA.

elongata. 1-2. B. foliis integris oppositis, calycibus pilosiusculis, fructu longioribus.
Ageratum folio & facie Rapunculi. *Plum. ic.* 19. t. 17. Peripea palustris. *Aubl. guian.* 627. t. 253.
India occidentalis, Jamaica.

LIPPIA.

cymosa. 5. L. floribus cymosis, foliis ovatis subintegris. Spireæ congener spinosa, folio subrotundo acuminato integro — *Sloan.* h. 2. 30. t. 174. f. 3. 4.

RUELLIA.

Blechioides. 1-2. R. foliis oblongis subdentatis glabris, spicis ovatis, floribus bracteis longioribus. *Jamaica.* ♄.

angustifolia. 1-2. R. foliis lineari-lanceolatis, spicis oblongis, bracteis ovatis hirsutis. ✿ *India occidentalis.*

rupestris. ? R. acaulis, foliis petiolatis oblongis crenato-undulatis, scapis erectis multifloris. *Hispaniola.* ♃.

VITEX.

umbrosa. 3-4. V. foliis quinatis integerrimis, utrinque glabris, racemis compositis axillaribus. *Jamaica.* ♄.

divaricata. 2-3. V. foliis ternatis integerrimis utrinque glabris, paniculis dichotomis divaricatis. ✿ *St. Crux, Christopher.* ♄.

COLUMNEA. Linn.

Cal. 5-phyllus.
Cor. ringens, labio sup. 3-partito, intermed. fornicata; supra basin gibba.
Antheræ connexæ.
Caps. 1-locularis. *Sem.* nidulantia.
(pone *Besleriam.*)

hirsu-

hirsuta. 2. C. foliis ovatis acuminatis serratis superne hirtis, foliolis calycinis denticulatis lanceolatis, corollisque hirsutis, labio superiori bifido. Achimenes 1. *Brown. jam.* 270. t. 30. f. 3. Rapunculus fruticosus — *Sloan.* h. 1. p. 157. t. 100. f. 1.
Jamaica. ♄.

hispida. 3. C. foliis ovatis obtusis denticulatis hispido-hirsutis, foliolis calycis lanceolatis integris pilosis; caule piloso scabro.
Jamaica. ♄.

rutilans. 4. C. foliis ovato-lanceolatis villosis denticulatis; foliis calycis laciniatis, corollis villosis, labio superiori bipartito.
Jamaica. ♄.

scandens. 1. C. *foliis ovatis acutis integris subvillosis, foliolis calycis integris, corollisque pubescentibus; labio superiori indiviso. Plum. gen.* 28. *ic.* 89. f. 1. Columnea scandens. *Linn. Jacq. hort.* III. 27. h. 48.

TAMONEA. Aublet. (XL.)

Cal. 5-aristatus. *Cor.* ringens, limbo 5-fido. *Nux* carnosa 4-locularis. *Sem.* solitaria.
(pone *Pedalium.*)

spinosa. 1. T. fructibus 4-spinosis.
Verbena curassavica *Linn.* Kæmpfero. *reliq. Houst.* t. 2.
India occidentalis; Antigua, Curacao. ☉.

mutica. 2. T. fructibus muticis. * Tamonea spicata. *Aubl. gvian.* 660. t. 268.
Gviana, Cayenna. ☉.

CLAS-

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DIANDRIA.

OMPHALEA. Linn.

MONOIC. ♂. *Cal.* 4 phyllus. *Cor.* nulla. *Filamentum* columnare cui *antheræ* apice insidentes.

♀. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla. *Stigma* trifidum. *Capsula* carnosa trilocularis.

axillaris. 3. O. racemis axillaribus; foliis distichis ovatis acuminatis nitidis petiolis brevissimis, stipulis mucronatis, caule fruticoso.
Jamaica. ♄.

cauliflora. 4. O. racemis caulinis basi sqvamosis, foliis distichis oblongis acutis nitidis, caule arborescente.
Jamaica. ♄.

cordata. 1. O. *racemis compositis foliosis terminalibus, foliis sparsis cordatis subtus villosis, basi biglandulosis, caule scandente.* Omphalea diandra. *Linn.*

nucifera. 2. O. *racemis compositis foliosis terminalibus, foliis sparsis oblongis glaberrimis basi biglandulosis, caule arboreo.* O. triandra. *Linn.*

TRIGYNIA.

GYMNANTHES. (XXXVIII.)

DIOIC. MONOIC. ♂. *Amentum* nudum. *Per.* O. *Cor.* O. *Stam.* pedicelli 3-partiti l. 3-chotomi. antheriferi.

♀. *Amentum.* 1. *Germen* pedicellatum. *Cor.* O. *Stylus* 3-fidus. *Capsula* 3-cocca 3-locularis.
(pone *Iuniperum.*)

elliptica. 1. G. dioica, staminibus 3-partitis, femineis amentaceis.
Jamaica. ♄.

lucida. 2. G. monoica, staminibus 3-chotomis, femineis solitariis pedicellatis.
Hispaniola. ♄.

MYRISTICA. (XVI.)

DIOIC. ♂. *Cal.* 3 fidus. *Cor.* nulla.
Filamentum columnare.
Antheræ terminales, coalitæ.
♀. *Cal.* 3 fidus. *Cor.* nulla.
Capsula supera, drupacea, bivalvis.
Nux macide involuta.

fatua. 3. M. foliis oblongo-lanceolatis, subtus pubescentibus, calycibus fructibusque villosis.
Tobago. ♄.

sebifera. 2. M. foliis cordatis oblongis subtus fructibusque tomentosis. * Virola sebifera. *Aubl. guian.* 904. t. 345.
Guiana. ♄.

aromatica. 1. M. *foliis ellipticis subtus pubescentibus, calycibus ovatis, fructibus lævibus.* †)

PEN-

†) Hæc vera est arbor *Nucis moschatae*, cujus characterem ignoravit dum vixit Cel. a LINNÉ, in Suppl. plantarum a SONNERATIO forte deceptus. Flores mihi qvamplurimi visi, ab Indiæ orientalis Banda & Isle de France allati, in Museo Ill. Jos. BANKS optime in spiritu vini asservati; ideoque certior factus de fructificatione hac singulari, primum ab Equ. THUNBERGIO in Act. Holm. 1782. p. 46. delineata, licet Ille antheram unicam filamentum cingentem descripsit; Numerus antherarum in *M. aromatica* vix distingvendus, qvia sulcis polliniferis assimilantur, nec ut in M. *fatua* & *sebifera* 3-magis distinctæ. AUBLETIUS quidem Virolam suam depinxit hexandram; qvod vero falsum & natura incongrum ex speciminibus ipsius diligenter examinatis attestari possum.

PENTANDRIA.

AYENIA.

lævigata. 1–2. A. foliis ovatis integris glaberrimis; germine pedicellato, nectario decemfido radiato.
Jamaica. ♄.

PASSIFLORA.

anguſtifolia. 8–9. P. foliis indiviſis ſubcordatis lanceolatis integris, petiolis 2-glanduloſis, floribus ſolitariis.
Jamaica. ♄.

oblongata. 16–17. P. foliis ellipticis, antice ſubtrilobis ſubtus punctatis, lobis acutiuſculis, intermedio breviori.
Jamaica. ♄.

parviflora. 18–19. P. foliis trilobis glabris: lobis ovatis integris, intermedio productiore, petiolis 2-glanduloſis; caule herbaceo.
Jamaica. ♃.

MELOCHIA.

venoſa. 3–4. M. pedunculis diſtinctis terminalibus multifloris, foliis ovatis ſerratis venoſis ſubtus tomentoſis, caule piloſo. Sida 17. *Mill. dict.*
Jamaica. ♄.

nodiflora. 4–5. M. floribus conglobatis axillaribus, capſulis globoſis, foliis ovatis acuminatis glabris. Abutilon fruticoſum — *Sloan.* h. 1. p. 219. t. 135. 2.
Jamaica. ♄.

lupulina. 4–5. M. racemis confertis axillaribus, calycibus inflatis membranaceis, foliis ovato-cordatis inciſo-ſerratis ſubtus tomentoſis.
Jamaica. ♄.

OCHROMA. (XXXVII. *.)

Cal. duplex: exterior 3-phyllus.
Antheræ connatæ, anfractuoſæ.
Capſula 5-locularis, polyſperma.
(pone *Melochiam.*)

Lagopus. 1. OCHROMA.
Hibiscus 10. *Brown. jam.* 286. Cotonnier siffleux *Nicol. Doming.* p. 223.
Gossypium l. Xylon arboreum *Pluk. alm.* t. 189. f. 2.
Jamaica, Hispaniola. ♄.

OCTANDRIA.

ALCHORNEA. (XXXVIII.)

DIOIC. ♂ *Calyx.* 3-5-phyllus. *Cor.* nulla.
☿ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* O.
Stylus 2-partitus.
Capsula baccata, 2-cocca.

latifolia. 1. ALCHORNEA.
Jamaica. ♄.

DECANDRIA.

HELICTERES.

jamaicensis 1-2. H. foliis cordatis acutis serratis, fructu ovato acuto contorto. H. jamaicensis *Jacq. am.* 235. t. 179. f. 99. Helicteres Isora. b. *Linn.*
Jamaica. ♄.

IATROPHA.

divaricata. 2-3. I. foliis ovatis acuminatis integris glaberrimis, racemis divaricatis.
Jamaica. ♄.

DODECANDRIA.

STERCULIA.

Ivira. 1-2. S. hermaphrodita, foliis ovatis 3-lobisve, floribus paniculatis, capsulis qvinque. ☉
Ivira pruriens *Aubl. gvian.* 694. t. 279.
India occidentalis. ♄.

ACA-

ACALYPHA.

* *Monoicæ.*

Hernandifolia. A. ſpicis femineis longisſimis, involucris cordatis ſerratis, maſculis diſtinctis aphyllis; foliis ſubcordatis ſerratis, petiolis longisſimis.
Jamaica. ♄.

Corenſis. A. floribus femineis terminalibus diſtinctis, involucris triphyllis, ſpicis maſculis axillaribus involucratis, foliis ovatis ſerratis. * A. corenſis: *Jacq. am.* 254. t. 161.
India occidentalis. ♄.

lævigata. A. ſpicis femineis involucris multipartitis, ſpicis maſculis laxis aphyllis, foliis cuneato-ovatis acuminatis ſerrulatis glaberrimis.
Jamaica ♄.

elliptica. A. ſpicis femineis involucris germinibus brevioribus ovatis dentatis hirſutis; maſculis aphyllis laxis; foliis ellipticis acuminatis dentatis.
Jamaica. ♄.

reptans. A. ſpicis terminalibus erectis, floribus mixtis, femineis inferioribus, involucris cordatis ſerratis, maſculis aphyllis, foliis ovatis ſerratis, caule reptante. Urtica minor iners ſpicata — *Sloan. hiſt.* 1. 125. t. 82. f. 3.
Jamaica, Hiſpaniola.

tomentoſa. A. ſpicis femineis terminalibus ſolitariis, involucris multipartitis, maſculis erectis, foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſcabris ſubtus villoſo-tomentoſis.
Hiſpaniola. ♄.

anguſtifolia. A. floribus femineis ſubſeſſilibus *terminalibus*, involucris ſerratis, *maſculis* ſpicatis, foliis linearibus ſerratis.
Hiſpaniola. ♄.

** *Dioicæ.*

ſcabroſa. A. ſpicis femineis involucris cordatis inciſis, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis ſcabris.
Jamaica. ♄.

betulæfolia. A. floribus femineis axillaribus sessilibus, involucris cordatis crenatis, masculis spicatis, foliis subrotundis crenatis glabris.
Jamaica. ♄.

CROTON.

sessiliflorum. 5-6. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis glabris, floribus sessilibus axillaribus dioicis 5-dris.
Hispaniola. ♄.

globosum. 5-6. C. foliis ovatis obtusis integris, pedunculis geminis, floribus dioicis; fructibus globosis echinato-hispidis.
Jamaica. ♄.

Eluteria. 5-6. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis sparsis glabris sqvamulosis, subtus argenteis, caule arboreo; racemis compositis axillaribus.
Clutia eluteria Linn.

divaricatum. 8-9. C. foliis oblongis obtusis serratis hirtis, basi biglandulosis, racemis terminalibus solitariis caule fruticoso, ramis dichotomis divaricatis.
India occidentalis. ♄.

nitens. 9-10. C. foliis cordato-ellipticis acuminatis subintegris glabris supra nitidis, subtus punctatis argenteis; racemis axillaribus foliis brevioribus erectis.
Jamaica. ♄.

Laurinum. 9-10. C. foliis oblongis acutis integerrimis consistentibus glabris, petiolis scabris foliisque subtus punctatis; racemis axillaribus longissimis patulis; caule arborescente.
Jamaica. ♄.

pallens. 9-10. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis utrinque glabris, racemis solitariis erectis terminalibus; calycibus fructu majoribus. C. fruticosum *Mill.*
India occidentalis. ♃.

macrophyllum. 9-10. C. foliis cordato-subrotundis acuminatis integris crassis tomentosis, subtus nervosis.
India occidentalis. ♃.

populifolium. 10-11. C. foliis lato-ovatis acuminatis ferrato-dentatis sub hirtis, petiolis longitudine foliorum; racemis terminalibus erectis solitariis.
India occidentalis, Jamaica. ♃.

POLYANDRIA.

CAROLINEA.

insignis. 2. C. foliis subseptenatis, foliolis obovato-oblongis. *
Xiloxochitl flore capillaceo. *Hern. mex.* 68.
Tobago, Vera Cruz. ♄.

princeps. 1. C. *foliis subqvinatis, foliolis ovato-lanceolatis.*
C. princeps. *Linn.*

SIDA.

arguta. 14-15. S. foliis cordatis serratis apice attenuatis; caule virgato, pedunculis axillaribus filiformibus unifloris. *Mill. dict.*
Jamaica. ♄.

althææifolia. 16-17. S. foliis cordatis subangulatis obtusis serrato-crenatis utrinque tomentosis, rostris seminum calyce brevioribus.
Althæa flore luteo. *Sloan.* h. p. 218. t. 136. f. 2.
Jamaica. ♄.

dumosa. 13-14. S. foliis cordatis acuminatis serratis utrinque glabris, floribus paniculatis.
Jamaica. ♄.

procumbens. 3-4. S. foliis cordatis ovato-subrotundis serratis villosis, caulibus procumbentibus hirsutis.
Hispaniola.

ALTHÆA.

corymbosa. 1-2. A. foliis simplicibus cordatis angulatisve glabris, pedunculis calycibusque pilosis, floribus corymbosis.
Hispaniola. ♄.

racemosa. 1-2. A. foliis simplicibus cordatis ovatis serratis superne scabris, racemo terminali erecto. Althæa 3. *Brown. jam.* 284. Alcea fruticosa aqvatica *Sloan.* h. 221. t. 139. f. 2. Pavonia spicata. *Cavanilles diss.* 3. p. 136. t. 46. f. 1.
Jamaica. ♄.

HIBISCUS.

...atus. 10-11. H. foliis cordatis subrotundis integris; pedunculis brevissimis unifloris, calyce 10-dentato. Hibiscus 1. *Brown. jam.* 284 Malva arborea *Sloan.* h. 1. 95. t. 134. f. 2. 3.
Jamaica. ♄.

ACHANIA. (XXXVII. æ.)

Cal duplex: *exterior* polyphyllus.
Cor. convoluta.
Bacca 5-sperma.

(pone *Hibiscum.*)

Malvaviscus. 1. A. foliis scabriusculis acuminatis, foliolis calycis exterioris erectis. Hibiscus malvaviscus *Linn.* Malva arborea. *Sloan*, h. 1. 216. t. 136. f. 1.
Malvaviscus arborea. *Cavanilles diss.* 3. p. 131. t. 48. f. 1.

pilosa. 2. A. foliis pilosis obtusis acutisque.
Jamaica. ♄.

MYRODIA.

Calyx simplex, monophyllus.
Cor. 5 petala. *Pist.* 1.
Columna antherifera indivisa.
Drupa sicca: *Nuces* binæ.

(inter *Mesuam* & *Morisonam.*)

turbinata. 1. M. foliis ellipticis, calycibus turbinatis intus subsericeis. *
Montserrat, Lucia, Christoph. ♄.

longi-

longiflora 2. M. foliis oblongis, calycibus cylindraceis intus villoſis, ſtaminum columna longisſima. [a] Qvararibea gvianenſis. *Aubl. gvian.* 692. t. 278. *Cavanill. diſs.* 3. *Gviana.* ♄.

PINUS.

Occidentalis. 4–5. P. foliis 5-nis margine ſcabris longisſimis; conis oblongis, ſqvamis apice truncatis. Pinus foliis qvinis ſcabris. *Plum.* p. 154. t. 161. *Hiſpaniola.* ♄.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

OCTANDRIA.

SECURIDACA.

virgata, 3. S. caule ſcandente, ramis virgatis, foliis ſubrotundis. *Securidaca* 1. *Brown. jam.* 287. Spartium alterum ſcandens, fructu alato, flore variegato. *Plum. H. mſs.* h. 2. p. 213. ic. 144. f. 1.
Hiſpaniola. ♄.

DECANDRIA.

AMERIMNON. Brown. (XXXII).

Calyx bilabiatus.
Legumen compreſſo-foliaceum 2-valve, dehiſcens. *Semina* aliqvot ſolitaria.
(poſt *Pterocarpum*).

Brownei, 1. A. inerme, foliis petiolatis alternis ſubcordato-ovatis, racemis compoſitis axillaribus lateralibusque. Amerimnon. 1. *Brown. jam.* 288. Tab. 31. f. 3. *Jacq. amer.* 199. t. 180. f. 58.
Jamaica. ♄.

Ebenus, 2. A. ſpinoſum, foliis ſubſeſſilibus aggregatis obovato-oblongis, pedunculis bifloris. Pterocarpus ſeſſilifolius *Linn.* P. buxifolius. *Murr.* Aſpalathus Ebenus *Linn.* Brya, *Brown. jam.* Spartium _ *Sloan.* h. 2. 30 t. 175. f. 1. Ebenus. *Pluk.* Spartium arboreſcens, *Mill. dict.*

TERAM-

TERAMNUS. (XXXII).

Carina minima, calyce recondita.
Stam. alterna; 5 ſterilia.
Stigma ſeſſile, capitatum.
(pone *Amorpham.*)

volubilis. 1. T. foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus. *Dolichos uncinatus. Linn.* Teramnus 1. *Brown, jam.* 290. Phaſeolus ſylveſtris minor, flore minori. *Sloan.* h. 1. p. 182. *Jamaica.* ♄

uncinatus. 2. T. foliis oblongis obtuſis, ſubtus ſericeis. *Jamaica.* ♄.

DOLICHOS.

roſeus. 31. D. caule repente adſcendente, foliolis ſubrotundis nitidis, floribus racemoſis, leguminibus dorſo 3-carinatis. Dolichos maritimus repens. *Brown. j.* 293. 4.

luteus. 26-27. D. volubilis, floribus ſubſpicatis, leguminibus ſubcylindricis glabris, foliis ſubrotundo-rhombeis obtuſis integris glabris. *Jamaica.* ♄.

GLYCINE.

phaſeoloides. 6-7. G. foliis ternatis, ſubtus villoſis, racemis terminalibus. Glycine 2. *Brown. jam.* 296. Phaſeolus florum ſpica pyramidata, ſemine coccineo, nigra macula notato. *Plum. Cat.* 12. *Jamaica*, *Domingo.* ♄.

reticulata. 11-12. G. foliis ternatis oblongo-lanceolatis pubeſcentibus, ſubtus reticulato-venoſis, racemis axillaribus ſubſeſſilibus, leguminibus oblongis compreſſis. *Jamaica* ♄.

CLITORIA.

multiflora. ? C. foliis pinnatis, foliolis oblongis subtus sericeis, racemis axillaribus multifloris.
Domingo. ♄.

GEOFFRÆA.

inermis. 2. G. inermis, foliolis lanceolatis.
Geoffræa inermis jamaicensis. *Wright. Act. Lond.* 1777. *vol.* 67. p. 512. t. 10.
India occidentalis, Jamaica. ♄.

spinosa. 1. G. *spinosa, foliolis oblongis obtusis.* G. spinosa *Linn. Jacq.*

ROBINIA.

sepium. 1–2. R. inermis, pedunculis racemosis, partialibus bifloris; foliis impari-pinnatis, pinnis ovatis acuminatis.
R. sepium. *Jacq. am.* 211.
Hispaniola. ♄.

HEDYSARUM.

adscendens. 17–18. H. foliis ternatis subrotundis subtus pubescentibus, caule tereti, ramis declinatis adscendentibus pilosis; racemis simplicibus erectis axillaribus.
Jamaica. ♄.

supinum. 20–21. H. foliis ternatis ovatis obtusiusculis, subtus incano-villosis, caule ramoso procumbente; racemis simplicibus erectis terminalibus.
Hedysarum triphyllum supinum — *Sloan.* h. 185. t. 118. f. 2.
Jamaica. ♄.

in-

incanum.	20–21. H.	foliis ternatis ovatis acuminatis ſubtus incanis, caule tereti ramoſo erecto; racemis terminalibus erectis, legum. declinatis hirtis. H. caneſcens *Mill. dict.* Hedyſarum fol. 3-natis ovatis. *Plum. ic.* 149. f. 1. *Jamaica, Hiſpaniola.* ♄.
trigonum.	21–22. H.	foliis ternatis ovatis acutis hirtis, caule ſcandente 3-quetro; racemis longisſimis axillaribus, legum. tortuoſis inflexis. Hedyſarum. 7. *Brown. jam.* 301. H. intortum. *Mill. dict.* *Jamaica, Hiſpaniola.*
ſcorpiurus.	25–26. H.	foliis ternatis oblongis, ſubtus hirſutis, caulibus procumbentibus 3-gonis, racemis axillaribus, legum. tereiiuſculis erectis. Hedyſarum. 9. *Brown. jam.* 301. *Hiſpaniola, Jamaica.*
tortuoſum.	28–29. H.	foliis ternatis ovali-oblongis obtuſis glabriuſculis, racemis erectis axillaribus, leguminibus tortuoſis compresſis pubeſcentibus. Hedyſarum 8. *Brown. jam.* 301. Hedyſarum triphyllum — *Sloan.* h. 1. 184. t. 116. f. 2. *India occidentalis.* ♄.
ſpirale.	28–29. H.	foliis ternatis ovatis obtuſis glabris, caule ramoſisſimo, ramis diffuſis; racemis laxis divaricatis, legum. ſpirali-tortuoſis. H. procumbens. *Mill. dict.* *Jamaica.* ♄.
axillare.	29–30. H.	foliis ternatis rhombeo-ſubrotundis, caule repente radicante, petiolis erectis; ſcapis axillaribus foliis longioribus. Hedyſarum 6. *Brown. jam.* *Jamaica, Domingo.*

AESCHYNOMENE.

ſenſitiva.	2–3. AE.	caule fruticoſo glabro, foliolis obtuſis, leguminibus lævibus obtuſis, ſtipulis acutis deciduis. [a] Hedyſarum arboreſc. foliis mimoſæ. *Plum. cat.* 1. *ic.* 149. *f.* 2. *India occidentalis.* ♄.

GALE.

GALEGA.

toxicaria. 3-4. G. ſpicis terminalibus pedunculatis, leguminibus teretibus pedicellatis patentibus, caule foliolisque incano-tomentoſis. Cytiſus. 2. *Brown. jam.* 296.
Galega frutescens, fol. ſericeis. *Plum. ic.* 126. t. 235.
India occidentalis. ♄.

STYLOSANTHES.

Calyx tubulatus, longisſimus, corollifer.
Germen ſub corolla.
Legumen biarticulatum, hamatum.
(pone *Aeſchynomenem.*)

procumbens. 1. S. foliis ternatis acuminatis linearis glabris, ſpicis multifloris, caule procumbente. Hedyſarum hamatum. α. *Linn.* Trifolium 1. *Brown. jam.* 298. Anonis non ſpinoſa major glabra — *Sloan.* h. 1. 178. t. 119. f. 2.
Jamaica, Hiſpaniola. &c.

viſcoſa. 2. S. foliis ternatis ovatis ciliatis hirſutis, ſpicis paucifloris, caule erecto.
Hedyſarum hamatum. b. *Linn.*
Trifolium 2. *Brown. jam.* Loto 5-phyllo ſiliqvoſo ſimilis, non ſpinoſa — *Sloan.* h. 1. 186. t. 119. f. 1.
Jamaica.

CLAS-

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

SYMPLOCOS.

Cal. 5-fidus ſuperus. *Cor.* 5-8-petala.
Stamina 4-plici ſerie tubo corollæ accreta.
Fructus (Drupa) 5-locularis, polyſperma.
(poſt *Hopeam*.)

octopetala. 2. S. floribus octopetalis.
Jamaica. ♄

martinicenſis. 1. S. *floribus 5-petalis.* Linn. Jacq.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

SONCHUS.

agrestis. 4-5. S. pedunculis tomentosis multifloris, calycibus glabris, caule striato, foliis inciso-serratis sessilibus.
Sonchus lævis *Sloan. cat.* 122. h. 255.
Jamaica. ⊙.

SPILANTHUS.

uliginosa. 3-4. S. foliis ovato-lanceolatis crenatis, caule erecto dichotomo, pedunculis terminalibus, floribus radiatis.
Jamaica. ⊙.

BIDENS.

hirsuta. 10-11. B. foliis oppositis ovato-lanceolatis integris tomentoso-hirsutis, caule scandenti fruticoso, pedunculis oppositis divergentibus multifloris. Eupatorium jam. foliis oblongis, subtus — *Sloan.* h. 1. 257.
Jamaica. ⊙.

CACALIA.

ruderalis. 14-15. C. caule herbaceo ramoso, foliis lanceolatis integris glaucis.
Kleinia ruderalis. *Jacq. am.* 215. t. 127.
Jamaica. ⊙.

ETHU

ETHULIA.

Struchium. 1–2. E. floribus axillaribus sessilibus, omnibus trifidis. Struchium 1. *Brown. jam.* 312. t. 34. f. 2.
Jamaica. ⊙.

EUPTATORIUM.

parviflorum. 1. E. fruticosum, foliis ovato-lanceolatis serratis glabris, corymbis patentibus, calycibus trifloris.
Jamaica. ♄.

nervosum. 17–18. E. foliis elliptico-lanceolatis attenuatis dentatis triplinerviis utrinque glabris, calycibus multifloris.
Jamaica. ♄.

rigidum. 17–18. E. foliis petiolatis ovatis acutis serrato-dentatis rigidis subtus scabris; caule subherbaceo.
Jamaica.

molle. 18–19. E. foliis petiolatis cordatis acutis subserratis pubescentibus; caule herbaceo tomentoso. Ageratum gvianense. *Aubl. gv.* 800. 3.
India occidentalis, Jamaica. ⊙.

villosum. 18–19. E. foliis oppositis decussatis, ovatis acutis subserratis subtus villoso-tomentosis, calycibus 8–15-floris, caule fruticoso. Conyza fruticosa cisti odore — *Sloan* h. 1. 257. t. 161. f. 2.
Jamaica, Domingo. ♄.

cordifolium. 18–19. E. foliis cordatis serratis subtus tomentoso-hirsutis, petiolis brevissimis; corymbis subsessilibus, calycibus sqvarrosis; caule fruticoso.
Jamaica. ♄.

montanum. 18-19. E. foliis cordatis acutis denticulatis petiolatis scabris subtus hirsutis; corymbis patentioribus, caule fruticoso.
Jamaica. ♄.

LAVE-

LAVENIA. (XLIX. compos. E).

Receptaculum nudum.
Pappus 3-aristatus, apice glandulosus.
Calyx subæqvalis. *Stylus* 2-fidus.
(inter *Eupatorium* & *Ageratum*.)

decumbens. 1. L. caule simplici decumbente, foliis subcordatis obtuse serratis.
Cotula verbesina. *Linn.*
Jamaica. ⊙.

erecta. 2. L. *Caule ramoso erecto, foliis ellipticis argute serratis.* Soland. *
Verbesina Lavenia. *Linn.* Adenostema *Forst.*

POLYGAMIM SUPERFLUA.

GNAPHALIUM.

albescens. 32–33. P. herbaceum, niveo-tomentosum, foliis lineari-lanceolatis, caule erecto, inferne indiviso, ramis terminalibus fastigiatis, floribus confertis conicis.
Jamaica. ♄.

americanum. 37–38. G. herbaceum, foliis radicalibus lingulato-lanceolatis subtus niveis, caule simplici erecto tomentoso, floribus spicatis lateralibusque sessilibus confertis. Gnaphalium amer. *Mill. dict.* Gnaphalium ad stoechadem citrinam accedens. *Sloan. cat. jam.* 125.
Gnaphalium 1. *Brown. jam.* 318.
Jamaica. ⊙.

CONYZA.

purpurascens. 15–16. D. foliis ovato-lanceolatis serratis subtomentosis, caule subherbaceo, inferne simplici superne corymboso, floribus ovatis.
Conyza 1. *Brown. jam.* 318.
Conyza major odorata — *Sloan.* h. 1. 258. t. 152. f. 1.
Jamaica. ⊙.

rigida.

rigida. 22–23. C. foliis petiolatis obovatis integris scabris subtus venosis; spicis flexuosis, floribus secundis geminatis. — *Plum. ic.* 14. f. 1. *Jamaica.* ♄.

CALEA.

lobata. 3–4. C. corymbis congestis, foliis alternis superioribus ovato-lanceolatis, inferioribus dentato-hastatis, sinuato-serratis. Conyza lobata *Linn.*
Santolina. 2. *Brown. j.* 315. Virga aurea major, sive — *Sloan.* h. 1. 260. t. 152. f. 2. Conyza fol. lobatis hastatis. *Plum. ic.* 96. *Jamaica.* ♄.

ERIGERON.

rivulare. 8–9. E. foliis cuneatis acutis hirtis apice utrinque dentatis, margine ciliatis, caulinis sessilibus; caule simpliciusculo erecto pauci-floro.
Jamaica, Hispaniola. ☉.

TUSSILAGO.

albicans. 2–3. T. scapo unifloro ebracteato, flore erectiusculo; foliis lanceolato-ovatis subtus tomentosis obsolete retrorsum serratis.
Leontodon tomentosum. *Linn. suppl.* 347.
Jamaica. ☉.

pumila. 2–3. T. scapo unifloro ebracteato erecto, foliis lyratis incisis denticulatis tomentosis.
Jamaica. ☉.

CINERARIA.

glabra. 8–9. C. floribus corymbosis, calycibus cylindricis; foliis oblongis acutis subdenticulatis enerviis, utrinque glabris subsucculentis; caule fruticoso.
Jamaica. ♄.

discolor. 8–9. C. floribus corymbosis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis subdenticulatis glabris, subtus niveo-tomentosis; caule fruticoso.
Jamaica. ♄.

PECTIS.

humifusa. 4. P. foliis ovatis subtus punctatis, basi utrinque ciliatis, caulibus procumbentibus. *
Jacobea humifusa Hyperici folio. *Plum. cat.* 10. *ic.* 84. t. 95. f. 2.
Guadeloupe, St. Cruz. ☉.

ECLIPTA.

sessilis. 4. E. ? caule erecto, foliis subamplexicaulibus ovatis dentatis; floribus axillaribus sessilibus discoideis.
Jamaica. ☉.

MATRICARIA.

prostrata. M. ? foliis simplicibus ovatis dentatis, pedunculis lateralibus unifloris; ramis decumbentibus. *
Curaçao.

VERBESINA.

pinnatifida. 3–4. V. foliis alternis pinnatifidis.
Bidens frutescens, sphondylii foliis & facie. *Plum. sp.* 10. *ic.* 41. t. 51.
Jamaica.

POLYGAMIA NECESSARIA.

MELAMPODIUM.

humile. 3. M. caule erecto, foliis lyrato-dentatis sessilibus.
Jamaica, Domingo. ☉.

TRIXIS

TRIXIS. (XLIX. E.)

Receptaculum paleaceum.
Pappus nullus. *Semina* apice villosa.
Corollulæ radii 3-fidæ.
(post *Melampodium.*)

therebinthinacea. 1. S. foliis ovatis serrulatis hispidis subtus hirsutis, floribus corymbosis.
Jamaica. ♄.

aspera. 2. T. foliis ovatis basi & apice attenuatis dentato-serratis asperis; floribus paniculatis. * Bailleria aspera. *Aubl. guian.* 804. t. 317.
India occidentalis. ♄.

erosa. 3. T. foliis lato-ovatis inciso-serratis rugosis scabris, petiolis longioribus.
Dominica, Christopher. ♄.

POLYGAMIA SEGREGATA.

ELEPHANTOPUS.

spicatus. 3. E. foliis ovato-lanceolatis serratis scabris, fasciculis florum sessilibus lateralibus, caule ramoso. E. spicatus. *Jussieu. Aubl. gu.* 878. Conyza minor inodora helenii folio. *Sloan.* h. 1. 256. t. 150. 3. 4.
Jamaica, Hispaniola. ♃.

angustifolius. 4. E. foliis caulinis lineari-lanceolatis integris villosis, floribus glomeratis, fasciculis sessilibus pedunculatisque, caule simplici. Conyza inodora helenii folio integro angusto. — *Sloan.* h. 1. 256. t. 148. f. 4.
Jamaica. ♄.

TETRANTHUS.

Calyx communis quadriflorus.
Perianth. flosc. proprium monophyllum.
Semina coronata.
Polygamia æqualis.
(post *Echinopen.*)

littoralis. 1. TETRANTHUS.
Hispaniola. ☉.

ROLANDRA. Rottboell.

Flosculi fasciculati in capitulum squamis interjectis.
Calyx partialis bivalvis, 1-florus.
Corollulæ hermaphroditæ.
Pappus nullus.
(post *Echinopen.*)

argentea. 1. ROLANDRA. Rottböll. *Coll. Hafn. med.* II. 256.
Amaranthoid. fruticosum. — *Sloan.* h. 1. 47. t. 7.
Echinops frutescens ad nodos floridus. *Plum. ic.* 114. t. 123.
Echinops fruticosus. *Linn. Sp. pl. ed.* 1.
India Occidentalis, ♄.

MONOGAMIA.

BRYONIA.

racemosa. 4–5. B. foliis cordatis trilobis, superioribus ovatis scabriusculis; floribus racemosis, baccis nutantibus ovalibus. B. racemosa. *Mill. dict.*
Bryonia racemosa, foliis ficulneis. *Plum. fil.* 83. t. 97.
Jamaica. ♄.

SICYOS.

edulis. 1–2. S. foliis angulatis, basi cordatis lobatis, fructu oblongo echinato. S. edulis. *Jacq. am.* 258. t. 163. Sechium. *Brown. jam.* 355.
India occidentalis. ☉.

LOBE-

LOBELIA.

acuminata. 17–18. L. caule erecto suffruticoso, foliis lanceolatis attenuatis serrulatis; racemo terminali multifloro. Lobelia 2. *Brown. jam.* 322. Rapunculus folio oblongo. *Sloan.* h. 1. t. 95. *Jamaica.*

stricta. 17–18. L. caule erecto suffruticoso, foliis inferioribus ovato-lanceolatis glabris, margine denticulato-aculeatis; racemo terminali spicato.* *India occidentalis, Guadeloupe.*

VIOLA.

stipularis. 21–22. V. caule simplici reptante, foliis ovato lanceolatis crenatis glabris, stipulis ciliatis; pedunculis solitariis terminalibus. * *India occidentalis, St. Christopher.* ♃.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

ORCHIS.

monorrbiza. 6-7. O. bulbo solitari indiviso, nectarii labio 3-partito: lateralibus setaceis, cornu lineari compresso germinis longitudine.
Orchis setacea? *Jacq. am.* 220.
Satyrium. 1. *Brown. jam.* 324.
Jamaica, Hispaniola. ♃.

SATYRIUM.

hirtellum. S. bulbis filiformibus, caule hirsuto, foliis ovatis trinerviis petiolatis vaginantibus, nectario cornuto, labio trilobo.
Jamaica. ♄.

plantagineum. S. *bulbis filiformibus, caule glaberrimo, foliis ovatis petiolatis vaginantibus, nectarii cornu incrassato, labio 3-lobo, medio acuminato.*
S. plantagineum *Linn.*

adnatum. S. bulbis fasciculatis, foliis radicalibus oblongis petiolis longissimis, scapo vaginato, nectario cornuto adnato, labio deflexo 2-lobo emarginato.
Jamaica, Hispaniola. ♃.

Orchioides. S. bulbis fasciculatis oblongis, foliis lato-lanceolatis, scapo vaginato, nectario cornuto, labio lanceolato acuminato. Satyrium 7. *Brown. jam.* 325.
Jamaica. ♃.

spirale. S. bulbis fasciculatis oblongis, foliis linearibus, scapo vaginato, floribus spirali-secundis, labio trilobo, medio majori crenulato.
Jamaica. ♃.

elatum.

elatum. S. bulbis fasciculatis crassis tomentosis, foliis radicalibus ovatis petiolatis, caule subnudo; nectario subtrilobo. Satyrium. 2. *Brown. jam.* 324. Helleborine foliis liliaceis, radice asphodeli minori. *Plum. ic.* 190.
Jamaica, Hispaniola. ♃.

MALAXIS. SOLANDR. (VII.)

Nectarium monophyllum, concavum, cordatum, postice acuminatum antice 2-fidum; *genitalia* in medio fovens.

(pone *Ophrydem.*)

spicata. 1. M. scapo qvadrangulari, floribus spicatis.
Jamaica. ♃.

umbelliflora. 2. M. scapo quinqvangulari, floribus umbellatis.
Jamaica. ♃.

SERAPIAS.

polystachia. 4-5. S. bulbis fibrosis, caule subdiviso geniculato, foliis oblongo-lanceolatis, racemo composito terminali; nectarii labio ovato recurvato.
Jamaica, Hispaniola. ♃.

flava. 4-5. S. bulbis fibrosis, caule subdiviso geniculato, foliis oblongo-lanceolatis, racemis compositis axillaribus, labio nectarii erecto acuminato.
Jamaica. ♃.

LIMODORUM.

utriculatum. 3. S. radice tuberosa, foliis radicalibus geminis vaginatis, vagina radicali inflata; scapo vaginato, floribus sessilibus.
Jamaica, Domingo. ♃.

gentianoides. 4. L. ? radice tuberosa; aphyllum, caule vaginato, floribus pedunculatis.
Jamaica. ♃.

CRANICHIS. (VII).

Nectarium galeatum.
(post *Arethusam.*)

aphylla. 1. C. bulbis fasciculatis teretibus acutis; scapo subnudo, petalis conniventibus.
Jamaica. ♃.

oligantha. 2. C. bulbis fasciculatis clauatis, foliis petiolatis oblongis acuminatis nitidis; scapo subnudo, spica filiformi, petalis conniventibus.
Jamaica. ♃.

diphylla. 3. C. bulbis fasciculatis filiformibus nudis, foliis petiolatis cordatis acuminatis geminis; scapo subnudo.
Jamaica. ♃.

stachyodes. 4. C. bulbis fasciculatis teretibus obtusis, foliis petiolatis ovatis acuminatis; scapo vaginato, spica tereti, petalis revolutis.
Jamaica. ♃.

muscosa. 5. C. bulbis filiformibus fasciculatis tomentosis, foliis radicalibus petiolatis ovatis, caulinis vaginatis; nectario intus punctato.
Jamaica. ♃.

EPIDENDRUM.

* *Scandentia.*

claviculatum. 1-2. E. caule scandente tereti ramoso, foliis sessilibus semiamplexicaulibus acutis concavis recurvis rigidis. Cerei affinis, scandens planta aphylla. *Sloan.* h. 1. t. 224. 3-4.
Jamaica, Hispaniola. ♃.

** *Caule folioso erecto.*

ramosum. E. caule ramosissimo suffrutescente, foliis linearibus emarginatis, racemis terminalibus compressis.
E. ramosum. *Jacq. am.* 221. t. 132.
Jamaica.

nutans

nutans. E. caule simplici, foliis ovato-lanceolatis enerviis amplexicaulibus, spica terminali nutante; labio nectarii trilobo, intermedio tridentato.
Jamaica.

umbellatum. E. caule simplici, foliis ovatis emarginatis amplexicaulibus aveniis; floribus terminalibus umbellatis. E. difforme? *Jacq. am.* t. 136.
Jamaica.

anceps. E. foliis cordato-lanceolatis amplexicaulibus horizontalibus, racemo terminali compresso ancipiti subflexuoso, floribus distichis, petalis interioribus capillaribus, labio trilobo.
Jamaica.

rigidum. E. foliis oblongis obtusis vaginantibus, racemo terminali compresso ancipiti, floribus distichis spathis majoribus; labio integro cordato-ovato acuto. E. rigidum. *Jacq. am.* 222. t. 134.
Jamaica.

diffusum. E. foliis oblongis amplexicaulibus, caule ancipiti, panicula terminali ramosissima diffusa; labio integro acuminato.
Jamaica.

montanum. E. foliis lanceolatis planis recurvis patentibus submembranaceis, racemo terminali simplici, floribus secundis; labio trifido.
Jamaica. ♃.

serrulatum. E. caulibus aggregatis subdiphyllis, foliis lanceolatis carinatis serrulatis, racemo terminali, floribus distichis.
Jamaica. ♃.

teretifolium. E. foliis semiteretibus, caule unifloro, labio apice triquetro.
Jamaica.

globosum. E. foliis teretibus canaliculatis, floribus terminalibus subsolitariis, labio ovato acuto; capsulis globosis. E. globosum. *Jacq. am.* 221. t. 133. f. 1.
Jamaica. ♃.

*** *Caule repente.*

sertularioides. E. caule filiformi repente articulato, foliis lanceolatis, pedunculis unifloris e vaginis radicalibus.
Jamaica. ♃.

testæfolium. E. caule repente, foliis incumbentibus ellipticis convexo-concavis carinatis, floribus sub foliis sessilibus.
Jamaica. ♃.

**** *Acaulia, foliis radicalibus.*

undulatum. E. foliis ellipticis acutis, scapo sarmentoso ramosissimo, petalis ovatis ungviculatis obtusis, labio dilatato emarginato undulato. Satyrium. 15. *Brown. j.* 326.
E. charraginense? *Jacq. am.* 228. t. 133. 4. Viscum radice majus & elatius delphinii flore ferrugineo et guttato. *Sloan.* h. I. 250. t. 148. f. 1. Helleborine maculosa, foliis aloës carinatis. *Plum. ic.* 178. f. 2.
Jamaica.

variegatum. E. foliis lanceolatis carinatis canaliculatis, margine cartilagineo-serratis, vaginis imbricatis, scapis vaginalibus racemo simplici; labio cruciato bilobo. E. tetrapetalum? *Jacq. am.* t. 132.
Helleborine foliis carnosis carinatis___? *Plum. ic.* 177. t. 182. 2.
Hispaniola. ♃.

Utricularioides. E. foliis lanceolatis lineatis planis, scapo paniculato, labio magno cordato, cornu brevissimo.
Jamaica, Hispaniola. ♃.

triquetum. E. foliis triquetris cultratis apice compressis lanceolatis acutis, scapo simplici; labio cordato ovato, lateribus emarginatis.
Jamaica. ♃.

sessile. E. foliis basi compressis superne latioribus, lanceolato-linearibus obtusis aveniis, pedunculis radicalibus brevissimis unifloris.
Jamaica. ♃.

flabel-

flabelliforme. E. foliis basi compressis superne dilatatis, ovato-lanceolatis acutis planis nervosis, pedunculis unifloris elongatis.
Jamaica, ♃.

subulatum. E. foliis subulatis sulcatis, pedunculis vaginatis radicalibus multifloris.
Jamaica. ♃.

Satyrioides. E. foliis subulato-teretibus, scapo paucifloro, corollis antice basi ventricosis.
Hispaniola. ♃.

tribuloides. E. foliis pedicellatis lanceolatis obtusis emarginatis, pedunculis brevissimis, capsulis globosis echinatis.
Jamaica. ♃.

corniculatum. E. foliis pedicellatis cuneatis oblongis, pedunculis radicalibus unifloris, corollis acuminatis curvis.
Jamaica. ♃.

lanceola. E. foliis pedicellatis lanceolatis acutis, pedunculis ex vaginis radicalibus bifloris.
Jamaica. ♃.

***** *Foliis bulbis innatis.*

angustifolium. E. folio lineari bulbo innato, scapo paniculato.
Jamaica. ♃.

palmifolium. E. foliis lato-lanceolatis nervosis membranaceis bulbo innatis, pedunculis radicalibus vaginatis multifloris, nectario cymbiformi integro reflexo.
Jamaica. ♃.

altissimum. E. foliis lanceolatis bulbis innatis, scapo ramosissimo sarmentoso, petalis oblongo-lanceolatis acutis, labio obcordato, petalis breviore. * E. altissimum *Jacq. am.* 229. t. 141.
Jamaica. ♃.

fragrans. E. folio lato-lanceolato enervi bulbo innato, scapo multifloro abbreviato, labio cordato.
Jamaica. ♃.

sangvineum. E. foliis geminis oblongis, bulbo innatis, scapo multifloro subflexuoso, labio subrotundo undulato emarginato, cornu adnato. Satyrium 3. *Brown. jam.* 325. piscum radice bulbosa major. — *Sloan.* h. 1. p. 250. t. 121. f. 2.
Jamaica. ♃.

labiatum. E. foliis radicalibus oblongis, bulbo medio solitari monophyllo, scapis paucifloris, labio oblongo corpusculo carnoso superne adnato.
Hispaniola. ♃.

polybulbon. E. caule repente bulbifero, bulbis diphyllis unifloris, flore pedunculato, labio cordato.
Jamaica. ♃.

proliferum. E. caulescens, foliis distichis subimbricatis ovatis; bulbis e vaginis foliorum diphyllis, floribus axillaribus sessilibus.
Jamaica. ♃.

vestitum. E. caule aphyllo, vaginis undique imbricato teretiusculo bulbifero, bulbis folio innato; floribus confertis e vaginis caulinis.
Jamaica. ♃.

vomiforme. E. caulescens, foliis bulbis innatis ovato-acuminatis convexis canaliculatis, subtus triquetris; scapis e sinu foliorum.
Jamaica.

******* *Caules repentes, foliis imbricatis.*

echinocarpon. E. caule compresso decumbente unifloro, foliis undique imbricatis distichis ovatis; capsulis muricatis. Limodorum pendulum. *Aubl. gvian.*
Jamaica. ♃.

trichocarpon. E. caule compresso tereti radicante, foliis undique imbricatis distichis linearibus; capsulis tomentosis.
Jamaica. ♃.

glaucum. E. caule compresso erectiusculo multifloro, foliis undique imbricatis distichis lato-lanceolatis glaberrimis subtus glaucis; capsulis nudis.
Jamaica. ♃.

graminoides. E. caule erecto compresso multifloro, foliis undique imbricatis distichis remotis linearibus, pedunculis longioribus.
Jamaica. ♃.

******* *Caules unifoliati.*

micranthum. E. caule unifolio, folio lato-lanceolato, racemo longissimo filiformi, floribus secundis subrotundis hexagonis.
Jamaica. ♃.

trigoniflorum. E. caule unifolio, folio oblongo lanceolato, racemo longitudine foliorum, floribus subsecundis trigonis. E. ophioglossoides. *Jacq. am.* t. 133. f. 3.
Jamaica. ♃.

racemiflorum. E. caule unifolio, folio ovato, racemo foliis longiore, floribus secundis, petalis interioribus ovatis.
Jamaica. ♃.

alpestre. E. caule unifolio, folio ovato-lanceolato, racemis laxis, capsularum carinis muricatis.
Hispaniola. ♃.

laxum. E. caule unifolio, folio oblongo, racemo longitudine foliorum, interioribus petalis subulatis, labio ovato, capsulis nudis.
Jamaica. ♃.

ovale. E. caule unifolio, folio ovato acuminato, racemo adpresso multifloro, petalis subrotundis, interioribus antice basi remotis, capsulis pedicellatis.
Jamaica. ♃.

pulchellum. E. caule unifolio, folio subrotundo-acuto, racemo laxo paucifloro, petalis acuminatis ciliatis, interioribus apice cruciantibus.
Jamaica. ♃.

tridentatum. E. caule unifolio, folio ovato-acuto apice tridentato, racemo multifloro, floribus triquetris acuminatis, petalis nectarii erectis incurvis.
Jamaica. ♃.

cochle-

cochlearifolium. E. caule unifolio, folio orbiculato convexo concavo, racemo paucifloro.
Jamaica.

✻✻✻✻✻✻✻✻ *Aphylla.*

funale. E. aphyllum, filiforme radicans: pedunculo 2-floro, labio 2-lobo, cornu longissimo subulato.
Jamaica. ♃.

filiforme. E. aphyllum, filiforme, radicans; pedunculis sub 3 floris, labio ovato, cornu brevissimo, apice capitato.
Hispaniola. ♃.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

obtusata. 9–10. A. foliis cordatis apice rotundatis 3-nerviis, subtus reticulato-venosis tomentosis; caule volubili, pedunculis solitariis. *
Aristolochia. fol. cordatis obtusis. *Plum. ic.* 27. t. 33.
Insulæ Caribeæ. ♃.

grandiflora. 9–10. A. foliis lato-cordatis, caule volubili subherbaceo, pedunculis solitariis: labio corollæ maximo, cauda longissima.
Brown. jam. 329. n. 4.
Jamaica. ♃.

CLASSIS XXI.

CRYPTOGAMIA.

PLANTÆ.

FICUS.

americana. 10-11. F. foliis ovatis oblongis venosis integerrimis baccis axillaribus pedunculatis confertis.
Ficus americana *Aubl.*
Ficus alia, foliis lauri fructu minore. *Plum. sp.* 124. t. 132. f. 2.
Ficus indica folio oblongo fructu minore pallide luteo sphærico, *Sloan.* h. 2. p. 140.
Jamaica. ♄.

FILICES.

OSMUNDA.

peltata. 11-12. O. surculo repente, fructificationibus pedatis distinctis subrotundo-dimidiatis integris; frondibus dichotomis laciniis linearibus.
Lichen digitatus Geranii facie. *Plum. fil.* T. 50. f. A.
Jamaica.

aurita. 11-12. O. scapis radicatis; frondibus inferne bipinnatis superne pinnatis, pinnis basi sursum auritis serratis convexis nitidis.
Jamaica.

lineata. 17-18. O. frondibus pinnatis lanceolatis, basi oblique cordatis margine integris; fructificantibus (pinnis) crenulatis medio squamosis.
Jamaica.

polypodioides. 17-18. O. frondibus lanceolatis pinnatifidis, laciniis confluentibus integris adscendentibus, punctis ad marginem elevatis, scapo lanceolato, pinnis remotis.
Jamaica.

MARA-

MARATTIA.

Capsulæ multiloculares: *Loculis* ſuperne dehiſcentibus.

(pone *Oſmundam.*)

alata. 1. MARATTIA.

ACROSTICHUM.

ſimplex. 1-2. A. frondibus integris glabris petiolatis, ſterilibus lanceolatis acuminatis, fertilibus lineari-lanceolatis.
Jamaica.

petiolatum. 1-2. A. frondibus integris glabris petiolatis, ſterilibus lineari-lanceolatis, fertilibus linearibus.
Jamaica.

latifolium. 1-2. A. frondibus petiolatis lato-lanceolatis glaberrimis integris marginatis; fructiferis ovato-lanceolatis, ſurculo repente. Acroſticum 1. *Brown. jam.* 104. Lingva cervina rigida & glabra. *Plum. fil.* 135.
Jamaica.

villoſum. 4-5. A. frondibus lato-lanceolatis ſubcrenulatis utrinque villoſis. Lingva cervina villoſa minor. *Plum. fil.* 127. f. D.
Jamaica.

muſcoſum. 4-5. A. frondibus petiolatis integris ſqvamoſis; ſterilibus oblongo-lanceolatis obtuſis, fertilibus lineari-lanceolatis.
Lingva cervina villis & ſqvamulis aureis muſcoſa. *Plum. fil.* 139.
Jamaica.

ſerrulatum. 5-6. A. frondibus linearibus dentatis, apice fructificantibus, ſurculo brevisſimo radicante.
Jamaica.

graminoides. 6-7. A. frondibus nudis linearibus apice ſubdichotomis fructificantibus.
Jamaica.

ſul-

sulphureum. 27-28. A. frondibus bipinnatis; pinnis alternis ovatis pinnatifidis, foliolis retusis serratis. Filix aurea pinnulis rotundis incisis, divisa. *Plum. fil.* 44. *Jamaica.*

PTERIS.

angustifolia. 2-3. P. frondibus simplicibus lanceolato-linearibus integris erectis margine toto fructificantibus. *India occidentalis.*

denticulata. 10-11. P. frondibus pinnatis, pinnis inferioribus semipinnatis lanceolatis, sterilibus denticulato-ciliatis, fertilibus integerrimis. *Hispaniola.*

aculeata. 16-17. P. fronde supradecomposita, foliis 2-pinnatifidis, pinnis lato-lanceolatis, caudice arboreo aculeato. Filix ramosa arborescens et aculeata. *Plum. fil.* t. 5. *Jamaica.*

HEMIONITIS.

lineata. 1-2. H. fronde lanceolato-lineari, lineis fructificantibus subparalellis longitudinalibus. *Jamaica.*

ASPLENIUM.

proliferum. 1-2. A. frondibus subsessilibus lato-lanceolatis primoribus obovatis, apice radicantibus. Phyllitis non sinuata apice folii radices agente. *Sloan.* h. I. 71. t. 26. f. 1. *Jamaica.*

pumilum. 7-8. A. fronde ternata, foliolis 3-partito-incisis. Hemonitis pumila 5-phylla? *Plum. fil.* 66. A. *Jamaica.*

dimidiatum. 11-12. A. frondibus pinnatis, pinnis trapezo-oblongis acuminatis sursum angulatis deorsum integris planis. *Jamaica.*

fragrans. 20-21. A. frondibus ſub-3-pinnatis, foliolis alternis, pinnis lanceolatis latiuſculis, apice ſerratis. *Jamaica.*

grandifolium. 22-23. A. frondibus pinnatis; pinnis alternis lanceolatis ſubſerratis, baſi ſuperne rectangulofis, inferne rotundatis. *Jamaica.*

diſſectum. 22-23. A. frondibus pinnatis, pinnis lanceolatis inciſo-ſerratis apice caudatis. Lonchitis dentata pinnularum cacumine disſecto. *Plum. fil.* 46. *Jamaica.*

præmorſum. 22-23. A. fronde 3-pinnatifida, pinnis ſubcuneiformibus, pinnulis apice eroſo-dentatis. *Jamaica.*

cicutarium. 22-24. A. fronde 3-pinnata glaberrima, ſuperioribus pinnatifidis, foliolis lanceolatis integris. Rutæ murariæ accedens, filicula non ramoſa minima. *Sloan.* h. 1. 92. t. 52. f. 3. mala.

POLYPODIUM.

* *Fronde indiviſa.*

anguſtifolium. 1-2. P. frondibus lineari-lanceolatis longisſimis acuminatis rigidis, margine convexo, fructificationibus ſparſis, ſurculo repente. *Jamaica.*

gramineum. 1-2. P. frondibus acuminatis integerrimis glabris, fructificationibus ſolitarii, ſurculo nudo. *Jamaica.*

marginellum. 1-2. P. frondibus cuneiformibus linearibus obtuſis marginatis glabris, fructificationibus ſolitariis confertis, ſurculo brevisſimo nudo. *Jamaica.*

repens. 1-2. P. frondibus lanceolatis acuminatis glabris integris, fructificationibus ſparſis; ſurculo repente. Lingva Cervina radice repente. *Plum. fil.* t. 134. *Jamaica.*

ferpens. 2-3. P. frondibus lanceolato-linearibus glabris fubundulatis, fructificationibus folitariis; furculo hirfuto radicante.
Lingua cervina fcandens anguftis & undofis foliis. *Plum. fil.* t. 124.
Hifpaniola.

** *Fronde pinnatifida.*

pendulum. 11-12. P. frondibus pinnatifidis fubfeffilibus glabris pendulis, lobis oblongis obtufiufculis.
Jamaica.

incifum. 13-14. P. frondibus lanceolatis pinnatifidis, lobis rotundatis, infimis minoribus coadunatis.
Polypodium incifis afplenii. *Plum. fil.* t. 91.
Polypodium fcolopendrioides. *Linn. Sp. pl. ed.* 1.
Jamaica.

trichomanoides. 13-14. P. frondibus pinnatifidis fubpilofis, lobis femiovatis obtufis.
Jamaica.

myofuroides. 13-14. P. frondibus pinnatifidis glabris, lobis in apicem lanceolatum coadunatis fructiferis; inferioribus remotis.
Jamaica.

incannum. 19-20. P. frondibus pinnatifidis, pinnis lanceolatis obtufis diftantibus patentibus integris, fubtus ftipiteque incano-fqvamulofis.
Acroftichum polypodioides. *Linn. Sp. pl.*
Acroftichum 2. *Brown. jam.* 105.

*** *Fronde pinnata.*

muricatum. 27-28. P. frondibus pinnatis, pinnis falcato-lanceolatis fubferratis furfum auritis, bafi & antice fpinofis, ftipite fqvamofo.
Trichomanes majus totum album pinnis aculeatis trapezii figura. *Sloan. h.* 82. t. 36. f. 4-5.
Jamaica.

ſemicordatum. 28–29. P. fronde pinnata, pinnis paralellis lanceolatis glaberrimis, baſi oblique cordatis, lobo inferiore gibboſiore, fructificationibus 4-ſeriatis. Lingva Cervina fol. enſiformibus ſerratis. *Plum. fil.* t. 113.
Jamaica.

ſagittatum. 28–29. P. fronde pinnata, pinnis lanceolatis obtuſis integris, baſi utrinque denticulo auctis inferioribus mutilatis 3-angularibus minutis.
Jamaica.

repens. 32–33. P. frondibus pinnatis repentibus, apice radicantibus, pinnis ſubcordatis ovatis obtuſis crenatis, baſi ſubauriculatis. Lonchitis aſplenii facie. *Sloan.* h. t. 30. f. 1. Adianthum. *Pluk. alm.* t. 253. f. 4.
Jamaica.

rhizophyllum. 32–33. P. frondibus pinnatis decumbentibus, apice caudatis fructiferis radicantibus, pinnis ovato-deltoideis.
Jamaica.

obliteratum. 35–36. P. fronde pinnata, pinnis alternis lato-lanceolatis attenuatis crenatis, crenis apice & baſi utrinque obliteratis.
Jamaica.

crenatum. 35-36. P. fronde pinnata, pinnis oblongo-lanceolatis crenatis glabris, fructificationibus dupliciter ſerialibus. Lingva Cervina rotundius crenata. *Plum. fil.* t. III. *am.* 10.
Jamaica.

**** *Fronde bipinnatifida.*

ſerra. 38–39. P. fronde bipinnatifida, pinnis linearibus longisſimis attenuatis ſerratis, ſerraturis ſemiovatis acutis ſtriatis.
Filix non ramoſa major, ſurculis — *Sloan.* h. 1. 90. t. 48. ?
Jamaica.

4-gonum. 38–39. P. frondibus 2-pinnatifidis; pinnis lanceolatis acuminatis oppoſitis diſtantibus horizontalibus, laciniis ovatis obtuſiuſculis, ſtipite tetragono.
Jamaica.

ſanctum

ſanctum. 38–39. P. frondibus ſubbipinnatis, pinnis ſuperioribus coadunatis, inferioribus linearibus obtuſis integris, infimis majuſculis acutis crenatis. Acroſtichum ſanctum *Linn.* Acroſtichum. *Brown. jam.* 105.
Filix jamaicenſis_*Pluk. alm.* 150. t. 283. *Sloan.* h. t. 49. 2.
Jamaica.

deltoideum. 39–40. P. fronde 2-pinnatifida, pinnis inferioribus abbreviatis integris oblongis deltoidibus reflexis.
Jamaica.

inviſum. 45–46. P. fronde 2-pinnatifida glabra; pinnis lineari-lanceolatis attenuatis longisſimis, pinnulis ovato-falcatis acutis integris, infimis æqvalibus. Filix non ramoſa major, ſurculis crebris pinnulis longis anguſtis. *Sloan.* h. 1. 90. t. 51.
Jamaica, Hiſpaniola.

patens. 45–46. P. fronde 2-pinnatifida, ſubtus villoſiuſcula; pinnis lineari-lanceolatis elongatis; pinnulis oblongis acutis integris, infimis longioribus. Filix non ramoſa minor_*Sloan.* h. 1. 91. t. 52. f. 1.
Jamaica.

hirtum. 53–54. P. fronde inferne 3-pinnatifida, ſuperne 2-pinnatifida & tandem pinnatifida, laciniis ovatis obtuſis ſubintegris, ſtipite ramisque hirtis.
Jamaica.

dichotomum. 61–62. P. dichotomum, frondibus pinnatis, pinnis lineari-lanceolatis integerrimis horizontalibus, ſubtus glaucis. Acroſtichum furcatum. *Linn.*
Polypodium dichotomum. *Thunb. Japon.* 338. t. 37. *Plum. fil.* 1. 28.

coriaceum. 66–67. P. fronde coriacea, inferne 3-pinnatifida, ſuperne 2-pinnata, pinnis pinnulisque acuminatis.
Jamaica.

denticulatum. 77-78. P. fronde inferne 4-pinnata, superne 3-pinnata glabra; pinnulis cuneato-ovatis incisis denticulatis fructificationibus solitariis. *Jamaica.*

armatum. 59-60. P. frondibus 4-pinnatis, pinnulis lanceolatis crenulatis supra glabris, inferne hirsutis, fructificationibus confertis; ramis ramulisque asperis, caudice arboreo aculeato. *Jamaica.*

glaucum. 64-65. P. frondibus 4-pinnatis, ramis ramulisque lanceolatis; pinnis lanceolatis pinnatifidis, laciniis ovatis acutis, subtus glaucis. *Jamaica.*

dissectum. 77-78. P. fronde 4-pinnatifida glabriuscula, pinnulis ovatis obtusis inciso-serratis, fructificationibus in sino solitariis, ramis ramulisque pubescentibus. Lonchitis altissima globulifera minor. *Plum. fil.* t. 31. Adianthum nigrum ramosum max. *Sloan.* h. 1. 96. t. 57. f. 1. 2. *Jamaica.*

effusum. 77-78. P. fronde 5-pinnatifida subglabra membranacea, pinnulis acutis argute serratis, rachibus ramulorum marginatis. Adianthum ramosum max. — *Sloan.* h. 1. t. 57. f. 3. *Jamaica.*

ADIANTUM.

* *Fronde composita.*

pumilum. 7-8. A. fronde pinnata, stipite capillari, pinnis alternis subrotundis serrulatis, summa majuscula trapezoidea, fructificationibus interruptis. Adianthum. 1. *Brown. jam.* 87. Filix parva: *Pluk. alm.* t. 251. 4. *Jamaica.*

deltoideum. 6-7. A. fronde pinnata, pinnis alternis deltoidibus obtusis, summa triangulari, fructificationibus superne & antice continuatis. *Jamaica.*

macro-

macrophyllum. 6–7. A. fronde pinnata, pinnis oppoſitis rhomboideis acutis, ima majori, infimis ſubhaſtatis reflexis, fructificationibus antice & inſerne continuatis. Adianthum 2. *Brown. jam.* 87. f. 38. f. 1. Trichomanes majus nigrum — *Sloan.* t. 81. 34.
Jamaica.

ſerrulatum. 15–16. A. fronde 2–pinnata, pinnulis deltoideo-oblongis ſerratis, fructificationibus ſolitariis ſuperioribus. A. ſerrulatum *Linn. Pluk. alm.* t. 253. f. 1.
Jamaica.

ſtriatum. 16–17. A. fronde 2–pinnata, pinnulis rigidis falcato-ovatis ſtriatis, fructificationibus ſuperioribus interruptis, ſtipite tereti aſpero.
Jamaica.

ſtrictum. 16–17. A. fronde 2–pinnata, pinnis tetragonis faſtigiatis erectis, pinnulis alternis lunatis integris, fructificationibus ſuperioribus continuatis.
Jamaica.

microphyllum. 15–17. A. fronde 2–pinnata: foliolis alternis oblongis obtuſis crenatis infimis pinnatifidis: Adianthum nigrum ramoſum, ramulis — *Sloan.* h. 1. 98. t. 13. f. 2.
Jamaica.

denticulatum. 21. A. frondibus decompoſitis: pinnis alternis trapezoideis acuminatis cretatis, crenis denticulatis, fructificationibus ſuperioribus interruptis. Lonchitis ſerrata & retuſa. *Plum. fil.* t. 52. Adianthum Jamaicenſe. *Pluk. phyt.* t. 252. 5.
Jamaica.

fragile. 21–22. A. fronde ſubſupradecompoſita ſuperne 2-pinnata; pinnis obovatis cuneatis integris, fructific. interruptis.
Jamaica.

tenerum. 21–22. A. fronde ſupradecompoſita: pinnulis alternis rhombeo-cuneiformibus obtuſatis inciſis, fructificationibus interruptis. Adianthum, 7. *Brown. jam.* 88. Adianthum ramoſius, pediculis lucidis. *Pluk. phyt.* t. 254. f. 1.
Jamaica, Hiſpaniola.

TRICHOMANES.

pusillum. 1–2. T. fronde simplici lineari incisa, surculo repente.
Jamaica.

reptans. 2–3. T. frondibus cuneato-ovatis inciso-pinnatifidis, surculo repente.
Jamaica.

asplenioides. 2–3. T. frondibus pendulis lanceolatis pinnatifidis glaberrimis, laciniis bilobis, lobis obtusis, fructificationibus bivalvibus.
Jamaica.

crinitum. 3–4. T. frondibus subpinnatis pilosis, pinnis ovatis pinnatifidis, laciniis bifidis, lacinulis obtusis, fructificationibus setigeris stipite erecto hirto.
Jamaica.

lucens. 3–4. T. frondibus 2-pinnatifidis pendulis lanceolatis hirsutis lucidis, pinnis paralellis, laciniis subrotundis subserrulatis, stipite hirsutissimo.
Jamaica.

sericeum. 4–5. T. frondibus 2-pinnatifidis pendulis lanceolatis tomentosis, pinnis alternis, laciniis linearibus obtusis integris, inferioribus 2-fidis, fructificationibus terminalibus hirsutis.
Trichomanes pendulum sericii instar molle, *Plum. fil.* t. 73.
Jamaica.

fucoides. 7–8. T. frondibus 2-pinnatifidis ovatis glabris, pinnis ovatis, laciniis bipartitis, lacinulis serratis obtusis, fructificationibus 2-valvibus, supra basin pinnarum insertis.
Jamaica.

ciliatum. 7–8. T. frondibus erectis 2-pinnatifidis deltoideis; pinnis ovatis, laciniis linearibus obtusis ciliatis, fructificationibus terminalibus bivalvibus hirtis, stipite marginato.
Jamaica.

lineare.

lineare. 7-8. T. frondibus fubbipinnatis pendulis lanceolatis glabris, foliolis remotis, pinnulis linearibus 2-partitis, fructificationibus terminalibus 2-valvibus, ftipite capillari.
Jamaica.

undulatum. 8-9. T. frondibus 3-pinnatifidis 2-pinnatisve pendulis lanceolatis, foliolis pinnisque alternis decurrentibus; laciniis linearibus retusis crenulato - undulatis, fructificationibus terminalibus 2-valvibus.
Jamaica.

rigidum. 10-11. T. frondibus 4-pinnatifidis erectis deltoidibus, foliolis patentibus, pinnis lanceolatis, laciniis linearibus apice incifis, fchyphis fructiferis pedicellatis axillaribus.
Jamaica.

polyanthos. 10-11. T. frondibus 4-pinnatifidis deltoideis erectis, pinnis pinnulisque decurrentibus, laciniis linearibus obtufis, fructificationibus bivalvibus numerofis, ftipite marginato.
Jamaica.

clavatum. 10-11. T. frondibus 4-pinnatifidis oblongo - lanceolatis laxis, pinnis pinnulisque decurrentibus, laciniis linearibus emarginatis, fructificationibus terminalibus 2-valvibus fubrotundis, ftipite teretiufculo.
Jamaica.

aculeatum. 13. T. fronde fupradecompofita fcandente ramofiffima, foliolis palmatis, laciniis linearibus obtufis, ftipite aculeato.
Acroftichum aculeatum *Linn.*

MUSCI.

LYCOPODIUM.

fqvarrofum. 3-4. L. foliis fubverticillatis undique reflexis, inferioribus fqvarrofis rigidis, caule dichotomo faftigiato, capfulis fparfis.
Selago Coridis folio *Dill. mufc.* 440. t. 57. f. 4.
Mufcus fqvamofus maximus erectus fabinæ folio — *Plum. fil.* 144. t. 166. f. A.
Jamaica, Guadeloupe.

taxifolium. 8–9. L. foliis ſparſis lanceolato-linearibus patulis; caule erecto dichotomo, fructificationibus ſparſis.
Jamaica.

dichotomum. 8–9. L. foliis ſparſis lineari-acuminatis patulis; caule declinato asſurgente dichotomo, ramis patulis, fructificationibus ſparſis.
Brown. jam. 84. 1.
Lycopodium dichotomum. *Jacq. Vindeb.* III. 26. t. 45.
Jamaica, Hiſpaniola, Martinica.

ſtolonife-rum. 23–24. L. foliis bifariis patentibus, ſuperficialibus oblongis acutis diſtichis, ſurculis tetragonis repentibus longisſimis, inferne ſubnudis ſtoloniferis; ſpicis terminalibus ſesſilibus. Muſcus ſqvamoſus repens — *Plum. fil.* t. 43.
Hiſpaniola.

FONTINALIS.

criſpa. F. ſurculis ramoſis pennatis, foliis duplicato-bifariis rotundatis patentibus imbricatis undulatis, capſulis lateralibus poſticis.
Sphagnum pennatum undulatum, vagina ſqvamoſa. *Dill. muſc.* 209. t. XXXII. f. 8.
Jamaica.

diſticha. F. ſurculis ſimplicibus, foliis bifariis patentibus retuſis imbricatis planis, capſulis lateralibus poſticis.
Jamaica, Hiſpaniola.

filicina. F. ſurculis erectis pinnatis, pinnis approximatis, foliis 5-fariis ovatis acutis; capſulis axillaribus.
Jamaica.

hypnoidea. F. ſurculis repentibus, ramis erectis ſubdiviſis ſparſis, foliis lanceolatis bicarinatis adpresſis, capſulis axillaribus.
Jamaica.

filiformis. F. ſurculis pendulis filiformibus ſimpliciuſculis divaricatis, foliis ovatis acutis denſis patulis, capſulis axillaribus ſparſis.
Hiſpaniola.

POLY-

POLYTRICHUM.

convolutum.	P.	caule simplici, foliis involutis subulatis. *Meth. Musc.* 33. t. I. f. 3. *Jamaica.*

MNIUM.

tomentosum.	2–3. M.	surculo dichotomo erecto tomentoso, foliis subulatis, capsulis sphæricis. *Jamaica.*
sphæricarpon.	2–3. M.	surculis erectis tomentosis filiformibus, ramis simplicibus fasciculatisque terminalibus, foliis capillaceis, capsulis sphæricis. *Jamaica.*
strictum.	7–8. M.	surculis caulescentibus, foliis capillaceis; pedunculis elongatis terminalibus, capsulis obliquis. *Jamaica.*

BRYUM.

agrarium.	6–7. B.	acaule, capsulis cylindricis erectiusculis subulatis, foliis lanceolatis acutis. *Jamaica.*
acuminatum.	6–7. B.	capsulis cylindricis erectis subulatis, surculis caulescentibus cæspitosis, foliis linearibus. *Jamaica.*
Lycopodioides.	9–10. B.	capsulis erectis, pedunculis abbreviatis foliratiis, surculis elongatis subramosis, foliis patentibus linearibus acutis serrulatis subundulatis. *Jamaica.*
parasiticum.	12–13. B.	capsulis erectiusculis, pedunculis brevissimis, surculis confertis ramosis brevibus, foliis patentibus linearibus. *Hispaniola.*
calycinum.	13–14. B.	capsulis erectiusculis, perichætiis longissimis longitudine pedunculorum; surculis erectis, foliis linearibus cirrhosis. *Jamaica.*

HYPNUM.

palmatum. 4–5. H. fronde ſimplicisſima pinnata ſubpalmata, apice pedunculifera, pinnis diſtantibus patentibus.
Jamaica.

polypodioides. 4–5. H. fronde ſimplicisſima pinnata lanceolata erecta, verſus apicem pedunculifera, pinnis obtuſis, pedunculis capſulisque incurvis.
Jamaica.

aſplenioides. 6–7. H. fronde ſubramoſa pinnata erecta lineari, apice pedunculifera, capſulis incurvis.
Jamaica.

fulgens. 10–11. H. ſurculis vagis longisſimis pendulis; frondibus compresſis foliolis diſtichis complicato-carinatis nitidis.
Jamaica.

diaphanum. 10–11. H. ſurculis vagis erectiuſculis ſubdiviſis, foliolis bifariis ovatis acuminatis pellucidis planis.
Jamaica.

albicans. 12–13. H. ſurculis repentibus ramoſis compresſis, ramis vagis, foliolis bifariis ovatis acutis pallidis, capſulis ſubnutantibus.
Jamaica.

glabellum. 13–14. H. ſurculis divaricatis erectiuſculis ramoſis, foliolis bifariis imbricatis oblongis obtuſis planis ſubdenticulatis.
Jamaica.

patulum. 29–30. H. ſurculis filiformibus repentibus, ramulis vagis brevisſimis, foliolis lanceolatis reflexo-patulis.
Jamaica.

reptans. 31–32. H. ſurculis reptantibus, ramis vagis faſciculatisve radicantibus filiformibus, foliolis capillaribus patulis, capſulis nutantibus.
Jamaica.

faſciculatum. 32–33. H. ſurculo erecto, ramis [terminalibus confertis ſubdiviſis, ramulis compresſis, foliolis oblongis decusſatis ſparſis.
Jamaica.

ta-

tamarisci. 32–33. H. surculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus subdivisis, foliis bifariis, subtus medio auriculatis, foliolis subrotundis acutis carinatis.
Jamaica.

flexile. 34–35. H. surculis repentibus pendulisque longissimis flexuosis, ramulis vagis abbreviatis teretibus recurvis, foliolis confertis ovatis patulis.
Jamaica.

nigrescens. 34–35. H. surculis filiformibus pendulis, ramis brevibus teretibus sparsis, foliis æqvalibus subulatis patulis.
Jamaica.

densum. 34–35. H. surculis erectis teretibus, ramis vagis simpliciusculis, foliolis approximatis lanceolatis acutis carinatis patulis.
Jamaica.

compositum. 35–36. H. surculis ramisque pinnato-sparsis, ramulis confertis, pedunculis brevissimis, capsulis erectis, calyptris pilosis.
Jamaica.

polytrichoides. 38–39. H. surculis teretibus erectis simplicibus, foliis patulis, pedunculis brevibus, capsula erecta calyptra pilosa.
Jamaica.

capillare. 40–41. H. surculis repentibus filiformibus ramosis, ramis confertis capillaribus, foliolis adpressis subulatis, capsulis ovatis erectis.
Jamaica.

tomentosum. 40–41. H. surculis repentibus tomentosis, ramis vagis confertis erectiusculis, foliolis acutis patentibus distantibus, capsulis cylindricis nutantibus, operculis incurvis.
Hispaniola.

depressum. 41–42. H. surculis confertis repentibus ramosis, ramulis depressis, foliolis lineari-lanceolatis patulis siccitate crispis, capsulis nutantibus.
Jamaica.

tribophyllum. 41–42. H. surculo repente, ramis distantibus erectis foliis capillaribus patentibus, capsulis erectis. Muscus.—Sloan. h. 1. t. 25. f. 1.
Jamaica.

micro-

microphyllum. 42–43. H. ſurculis confertis repentibus ramoſis, ramulis filiformibus teretibus erectis, foliolis incumbentibus ſubulatis; capſulis obliqvis.
Jamaica.

cæſpitoſum. 43–44. H. ſurculis confertis ſimplicibus erectiuſculis tereti-compreſſis, foliol. ovato-lanceolatis, pedunculis ſurculis brevioribus, capſulis erectis.
Hiſpaniola.

pungens. 43–44. H. ſurculis confertis erectis teretibus ramoſis apice attenuatis acutis; foliol. lanceolatis ſubulatis patulis rigidiuſculis, pedunculis capillaribus brevibus.
Jamaica.

congeſtum. 44–45. H. ſurculis confertis ramoſis declinatis, ramis erectiuſculis apice inflexis, foliolis ſecundis ſubcapillaceis; pedunculis brevibus.
Jamaica.

tetragonum. 44-45. H. ſurculis repentibus, ramis vagis erectiuſculis tetragonis, foliol. 4-farie imbricatis concavis.
Jamaica.

torquatum. 44–45. H. ſurculis repentibus confertis, ramis erectis teretibus, foliol. ſiccitate ſpiraliter adpreſſis, calyptra coriacea baſi 5-partita.
Jamaica.

cirrhoſum. 44–45. H. ſurculis repentibus confertis, ramis ſubdiviſis, foliolis ſiccitate revolutis, capſulis globoſis, calyptris baſi multipartitis.
Jamaica.

ALGAE.

IUNGERMANNIA.

adianthoides. 1–2. I. frondibus erectis ſubdiviſis ſimpliciter pinnatis, foliolis obliquis ovatis ciliatis; fructificationibus terminalibus.
Jamaica.

criſta-

criſtata. 1–2. I. ſurculis repentibus, frondibus ramoſis erectis, foliolis lanceolatis acutis patentibus incumbentibus margine ſuperiore ſerratis, ſubtus lobis conniventibus criſtatis.
Jamaica.

proſtrata. 1–2. I. frondibus filiformibus reptantibus proſtratis ſimpliciuſculis, ſimpliciter pinnatis, foliolis alternis ovatis integris.
Jamaica.

pallens. 4–5. I. frondibus erectis ramoſis, foliolis ſimpl. pinnatis incumbentibus *ſubrotundis* integris, baſi ſemicordatis, perichætiis monophyllis retuſis infundibuliformibus.
Jamaica.

ſimplex. 4–5. I. ſurculis filiformibus repentibus, frondibus erectis ſimplicibus, foliolis ſimpl. pinnatis ovatis diſtantibus ſerrato - ciliatis fructific. terminalibus.
Jamaica.

perfoliata. 5–6. I. frondibus confertis erectis indiviſis, ſimpl. pinnatis, foliolis perfoliatis incumbentibus ſecundis ovatis integris.
Jamaica.

connata. 7–8. I. frondibus vagis ſimpl. pinnatis, foliol. oppoſitis incumbentibus apice retuſis ſubemarginatis poſtice connatis bidentulis; fructific. terminalibus, perichætio denticulato.
Jamaica.

tenera. 10–11. I. frondibus ſimpliciter pinnatis congeſtis repentibus, foliolis alternis diſtantibus ſubrotundis integris, auriculis ſubtus medio minutisſimis bifidis.
Jamaica.

ſerrulata. 11–12. I. ſurculis confertis erectis ſimpliciuſculis obtuſis ſupra 2–pinnatis, foliolis ſecundis ovatis concavis 2–fidis ſerratis, fructificationibus terminalibus, perichætio ſubulato.
Jamaica.

juni.

juniperoidea. 11–12. I. frondibus erectis simplicibus rigidis supra 2-pinnatis apice floriferis, foliis lanceolato-falcatis bifidis secundis.
Jamaica.

capillaris. 12–13. I. surculis repentibus ramosis capillaribus supra bipinnatis, foliolis subimbricatis omnibus tripartitis.
Jamaica.

cupressina. 12–13. I. frondibus procumbentibus confertis pennatis supra 2-pinnatis, foliolis imbricatis convexis 4-fidis.
Jamaica.

transversalis. 16–17. I. frondibus transversaliter repentibus duplicato-imbricatis, foliolis subrotundis integris.
Jamaica.

flava. 16–17. I. frondibus repentibus ramosis duplicato-imbricatis, foliolis subrotundis, inferioribus minimis 2-fidis, perichætiis monophyllis retusis.
Jamaica.

diffusa. 16–17. I. frondibus dichotomis erectis duplicato-imbricatis (surculis ramosissimis,) foliolis ovatis convexis inferioribus subrotundis dentatis.
Jamaica, Hispaniola.

stolonifera. 16–17. I. frondibus erectis confertis subdivisis duplicato-imbricatis, stolonibus reptantibus filiformibus, foliolis lanceolatis 3-dentatis secundis, inferioribus minimis subrotundis.
Jamaica.

brachiata. 16–17. I. frondibus erectis dichotomis duplicato-imbricatis, foliolis ovatis planis, inferioribus subrotundis convexis.
Jamaica.

atrata. 18–19. I. surculis ramosissimis pendulis capillaribus duplicato imbricatis; foliolis ovatis retusis, inferioribus minutis cordatis bifidis.
Jamaica.

filiformis. 18–19. I. frondibus erectis filiformibus simpliciusculis duplicato-imbricatis, foliolis subrotundis integris, inferioribus minutis.
Jamaica.

fili-

filicina. 19–20. I. surculis erectis ramosis pennatis, pinnis linearibus duplicato-imbricatis, foliolis ovatis acutis serrulatis, inferioribus subemarginatis dentatis.
Jamaica.

tomentosa. 20–21. I. surculis erectis confertis pennatis, pinnis duplicato-imbricatis, foliolis laciniatis tomentoso-ciliatis, fructificationibus terminalibus solitariis.
Jamaica.

bifaria. 22–23. I. surculis erectis simpliciusculis confertis bifariam imbricatis, foliolis subsecundis ovatis acutis denticulatis, fructificationibus terminalibus.
Jamaica.

sinuata. 29–30. I. acaulis, fronde plana integra & pinnatifida sinuata, lobis coadunatis obtusis.
Jamaica.

fucoidea. 30–31. I. frondibus erectis supradecompositis, foliis oppositis, pinnis oppositis linearibus.
Jamaica.

2–pinnata. 31–32. I. acaulis, frondibus procumbentibus, ramosa 2–pinnata; pinnis lacinulisque linearibus acutis.
Jamaica.

dichotoma. 32–33. I. acaulis, fronde lineari dichotoma erectiuscula.
Jamaica.

linearis. 32–33. I. acaulis, fronde reptante lineari dichotoma divaricata.
Jamaica, Hispaniola.

polyphylla. 32–33. I. acaulis, frondibus congestis subrepentibus laciniatis palmatisque, fructificationibus radicalibus.
Jamaica.

MARCHANTIA.

hirsuta. 1–2. M. calyce communi hemisphærico 8–fido hirsuto.
Jamaica.

RICCIA.

reticulata. ? R. fronde difformi laciniata glabra reticulata.
Lichenoides gelatinos. tenue reticulatum. *Dill. musc.* t. 19. f. 21.
Jamaica.

ANTHOCEROS.

crispus. 2–3. A. frondibus sinuatis laciniatis undulatis margine crispis.
Jamaica.

LICHEN.

fungoides. 21–22. L. leprosus candidus, tuberculis stipitatis capitatis difformibus subcarneis, stipitibus longioribus.
Jamaica.

pannosus. 24–30. L. crustaceus, subtus nigro-tomentosus, superne sublobatus obsolete multifidus, scutellis convexis rufis.
Jamaica.

impressus. 30–31. L. crustaceus albicans, scutellis concavis atro-cærulescentibus albo-marginatis. *Act. Scient. Ups.* IV.
Jamaica.

gossypinus. 31–32. L. crustaceus capillaceus mollis tomentosus candidus; scutellis nigris margine albidis.
Jamaica.

pictus. 34–35. L. imbricatus, foliolis multifidis sinuatis adnatis centrifugis albidis; scutellis atris albo-marginatis.
Jamaica.

Cocoes. 45–46. L. imbricatus; foliolis adnatis sinuatis candidis, scutellis parsis atris.
Jamaica.

damæcornis. 52–56 L. foliaceus; multipartito dichotomus glaber, apicibus bifidis, subtus tomentosus; peltis marginalibus.
Jamaica.

laci.

laciniatus. 52-53. L. foliaceus, depressus rigidus, irregularis laciniatus incisus glaber subtus tomentosus. *Jamaica.*

flavicans. 57-58. L. foliaceus, lineari-teretiusculus ramosus fulvus, scutellis planis marginalibus concoloribus. Usnea. *Brown. jam.* 80. 2. *Jamaica.*

cerotophyllus. 58-59. L. foliaceus rectus laciniatus, foliolis obtusis cornigeris. *Jamaica.*

diaphanus. 59-60. L. foliaceus, membranaceo-pellucidus cærulescens tenerrimus laciniatus plicato-undulatus, laciniis crispatis; scutellis sparsis ferrugineis. *Jamaica.*

marginellus. 59-60. L. foliaceus, membranaceo-pellucidus lobatus plicato-undulatus, scutellis marginalibus minutis ferrugineis albo-marginatis. *Jamaica.*

vesiculosus. 59-60. L. foliaceus, membranaceo-pellucidus lobatus undulatus vesiculosus, vesiculis turbinatis inferne apertis, apice scutelligeris, scutellis convexis rufis.

dissectus. 66-67. L. foliaceus, depressus laciniato-lobatus, (junior multifidus) obtusus lævis utrinque albidus, peltis concavis sparsis. *Jamaica.*

tomentosus. 67-68. L. foliaceus, depressus, membranaceus rotundatus inciso-lobatus lævissimus, lobis 2-fidis, inferne villoso-tomentosus. *Jamaica.*

aggregatus. 106-107. L. fruticulosus, perforatus ramosissimus, ramulis erectis, tuberculis granulosis aggregatis terminalibus. *Jamaica.*

melanocarpus. 109-110. L. fruticulosus, solidus ramosus albidus, ramulis foliolisque compressis, tuberculis globosis depressis atro-tomentosis. *Jamaica.*

ramulosus. 111-112. L. fruticulosus, solidus tectus ramosus, foliolis filamentosis, tuberculis globosis solidis terminalibus. *Jamaica.*

FUCUS.

trifarius. 27–28. F. fronde triquetra ramosa, foliis trifariis apice bifidis. *Fucus triqueter.* Gmel. fuc.
Jamaica.

ULVA.

montana. 1–2. U. plana reniformis sessilis aggregata zonata subtus incana.
Montes cærulea Jamaicæ.

BYSSUS.

sanguinea. 6–7. B. capillacea velutina perennis coccinea cortici adnascens.
Jamaica.

FUNGI.

AGARICUS.

striatus. 38–39. A. acaulis, convexus ferrugineus pubescens, margine integro, lamellis alternis interruptis cinereis.
Jamaica.

radiatus. 38–39. A. acaulis flabelliformis albidus villosus, margine inciso-crenato; lamellis concoloribus.
Jamaica.

BOLETUS.

membranaceus. 8–9. B. acaulis gregarius proliferus submembranaceus lævis radiatus albus, poris erosis difformibus.

villosus. 2–7 B. acaulis, submembranaceus fasciatus griseo - albidus villosus, poris difformibus dentatis.
Jamaica.

hydnoi-

hydnoides. 2-3. B. acaulis crassus setis ramosis erectis densis nigris superne tectus, poris tenuissimis teretibus.
Jamaica.

fasciatus. 2-3. B. acaulis durus superne inæqvalis fuscus nigro-fasciatus, poris albidis tenuissimis.
Jamaica.

resupinatus. 7-8. B. acaulis resupinatus subtus glabriusculus albus, superne poris impalpabilibus fuscis.
Jamaica.

microporus. 7-8. B. acaulis ligneus durus difformis inæqvalis, poris inæqvalibus impalpabilibus pallidis. Poria 4. *Brown. jam.* 77.
Jamaica.

HYDNUM.

agaricoides. 7. H. acaule convexum læve pallidum, subtus ferugineum.
Jamaica.

resupinatum. 8. H. acaule planum imbricatum subtus scabrum, supra setis ramentaceis ferrugineis tectum.
Jamaica.

sericeum. 9. H. acaule imbricatum planum, textura molli, utrinque sericeum exalbido-virescens.
Jamaica, Hispaniola.

HELUELLA.

versicolor. 3. H. acaulis membranacea fasciis discoloribus, inferne lævis alba.
Jamaica.

tremellina. 4. H. acaulis coriacea undulata lævis plumbea, subtus incano-villosa.
Jamaica.

atrata. 5. H. acaulis membranacea fragilis utrinque lævis, nigra.
Jamaica.

pallida. 6. H. acaulis coriacea fragilis utrinque lævis, ſuperne fuſca, inferne albeſcens.
Jamaica.

PEZIZA.

nigreſcens. 6–7. P. globoſo-campanulata obliqva, intus glabra atra extus incano-villoſa; margine integro.
Jamaica.

flava. 6–7. P. globoſo-campanulata obliqva, intus pubeſcens extus glaberrima, utrinque flava; margine integro.
Jamaica, Hiſpaniola.

CLAVARIA.

fuſca. 2–3. C. cæſpitoſa fuſca, caulibus ſubſimplicibus compreſſis baſi coalitis tomentoſis, apice interdum furcatis.
Hiſpaniola.

ADDEN-

ADDENDA & CORRIGENDA.

p. 12. post CYNOMORIUM *jamaicens.*
coccineum. 1. C. *stipite squamoso, amento cylindraceo, squamis imbricatis ovatis retusis.*
Cynomorium *Linn. Mich.*

p. 15. post THOUINIAM *ligustrinam.*
nutans. 1. T. *foliis ellipticis, paniculis axillaribus, floribus nutantibus.* T. nutans *Linn.*

p. 29. post DIODIAM *simplicem:*
virginica. 1. D. *caule ramoso procumbente laevi.*
Diodia virginica. *Linn.*

p. 31. post ÆGIPHILAM *elatam:*
martinicensis. 1. AE. *foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, ramis diffusis, paniculis terminalibus axillaribusve, calycibus glabris.* AE. martinicensis *Linn.* Jacq.

p. 32. post SAMARAM *coriaceam:*
laeta. 1. S. *floribus confertis pedicellatis, foliis ovatis obtusis.* S. laeta. *Linn.*

p. 50. post ITEAM *Cyrillam:*
virginica. 1. I. *foliis ovatis acutis serratis.* Itea virginica. *Linn.*

p. 51. post HIRTELLAM *paniculatam:*
americana. 1. H. *foliis ovato-lanceolatis, ramulis hirsutis, racemis erectis simplicibus, floribus 5-dris.* H. americana *Linn.*

p. 58. exclude *Cocoem acicularem*, quae est Bactris minor Jacq. 1: Cocos guienensis. *Linn.* Ejus loco inseritur:
aculeata. 3. C. aculeato-spinosa, caudice fusiformi, frondibus pinnatis, stipitibus spathisque spinosis. Cocos aculeatus. *Jacq. am.* 278. t. 179. ?
Palma pinnis & caudice ubique aculeatissimis fructu majusculo. *Brown. jam.* 344. 7.
Palma tota spinosa major. *Sloan. h.* 2. 119. t. 214.
Jamaica, Hispaniola. ♄.

p. 59. post GUETTARDAM *rugosam* :

speciosa. 1. G. *foliis cordatis lato-ovatis subsericeis, floribus subhexandris, tubo elongato.* G. speciosa. *Linn.*

p. 75. post TRIOPTERIDEM *rigidam* :

jamaicensis. 1. T. *foliis oblongis acuminatis venosis nitidis, racemis compositis terminalibus laxis, capsulis 3-alatis.*
T. jamaicensis. *Linn.*

---

p. 21. lin. 26. *loco* Paspatum *leg.* Paspalum.
22. — 2. *loco* subsolitaris *leg.* subsolitari.
31. — 1. *loco* Triandria *leg.* Tetrandria.
31. — 27. *loco* AEFgiphila *leg.* AEgiphila.
62. — 4. *loco* Alophyllus *leg.* Allophylus.

IN-

INDEX.

Columna prior numerum ſpecierum, poſterior paginam indicat.

A.

Acalypha	9.	99.
Achania	2.	102.
Achyranthes	1.	51.
Acidoton	1.	83.
Acroſtichum	8.	128.
Adianthum	10.	134.
Aegiphila	3.	31.
Aeſchynomene	1.	107.
Agaricus	2.	148.
Agroſtis	1.	25.
Alchemilla	1.	38.
Alchornea	1.	98.
Allophylus	3.	62.
Alpinia	1.	11.
Althæa	2.	101.
Amomum	1.	11.
Amerimnon	2.	104.
Ammannia	1.	33.
Anagallis	1.	40.
Andromeda	3.	73.
Andropogon	3.	26.
Anthoceros	1.	146.
Apeiba	4.	83.
Aralia	2.	55.
Ardiſia	5.	46.
Argythamnia	1.	39.
Ariſtolochia	2.	126.
Aſclepias	1.	53.
Aſplenium	8.	129.
Ayenia	1.	97.

B.

Baniſteria	1.	75.
Bauhinia	1.	66.
Begonia	2.	86.
Bellonia	1.	42.
Bidens	1.	110.
Bignonia	3.	91.
Boehmeria	5.	34.
Boletus	6.	148.
Bromelia	2.	56.
Broſimum	2.	12.
Brunfelſia	1.	90.
Bryonia	1.	116.
Bryum	5.	139.
Buchnera	1.	92.
Bumelia	7.	50.
Byſſus	1.	148.

C.

Cacalia	1.	110.
Cactus	2.	77.
Calea	1.	113.
Callicarpa	2.	31.
Calyptranthes	3.	79.
Capparis	2.	81.
Camocladia	1.	17.
Cardioſpermum	1.	64.
Carex	1.	18.
Carolinea	1.	101.
Caſſia	3.	66.

Catesbæa	1.	30.
Celtis	3.	55.
Cenchrus	1.	26.
Cephaëlis	4.	45.
Cestrum	1.	49.
Chionanthus	2.	13.
Chloris	5.	25.
Chrysophyllum	3.	49.
Cinchona	3.	41.
Cineraria	2.	113.
Citharexylon	3.	91.
Clavaria	1.	150.
Clethra	1.	74.
Clinopodium	1.	88.
Clitoria	1.	106.
Coccoloba	1.	64.
Coccosipsilum	1.	31.
Cocos	1.	151.
Columnea	3.	93.
Conyza	2.	112.
Cordia	2.	47.
Costus	2.	11.
Cranichis	5.	120.
Crantzia	1.	38.
Croton	9.	100.
Cupania	3.	61.
Cynanchum	2.	52.
Cynomorium	2.	12.
Cyperus	4.	20.

D.

Daphne	3.	63.
Dichondra.	1.	54.
Diodia	4.	29.
Diospyros	1.	62.
Dolichos	2.	105.
Dorstenia	1.	34.

E.

Echites	4.	52.
Eclipta	1.	114.
Ehretia	1.	47.
Elephantopus	2.	115.
Epidendrum	49.	120.
Epigea	1.	73.
Erigeron	1.	113.
Ernodea	1.	29.
Eroteum	2.	85.
Erythroxylon	1.	75.
Ethulia	1.	111.
Eupatorium	7.	111.
Euphorbia	3.	76.
Evolvolus	1.	55.

F.

Fagara	4.	33.
Ficus	1.	127.
Fontinalis	5.	138.
Fuchsia	1.	62.
Fucus	1.	144.

G.

Galega	1.	108.
Gardenia	3.	51.
Geoffræa	1.	106.
Gesneria	9.	89.
Glycine	2.	105.

Gnapha-

Gnaphalium	2.	112.
Gratiola	1.	14.
Guettarda	3.	59.
Gymnanthes	2.	95.

H.

Hamellia.	4.	46.
Hedera.	2.	51.
Hedwigia	1.	62.
Hedyoſmum	2.	84.
Hedyotis	1.	29.
Hedyſarum	8.	106.
Helicteres	1.	98.
Heliotropium	1.	40.
Helvella	4.	14[illegible].
Hemionitis	1.	129.
Hepetis	1.	56.
Hibiſcus	1.	102.
Hillia	1.	58.
Hippocratea	1.	17.
Hirtella	2.	51.
Hoffmannia	1.	30.
Holoſteum	1.	27.
Homalium	2.	86.
Hydnum	3.	149.
Hydrocotyle	1.	54.
Hydrolea	1.	54.
Hypnum	27.	140.

I.

Iacquinia	1.	47.
Iatropha	1.	98.
Itea	1.	50.
Iungermannia	28.	143.
Iuſticia	7.	13.
Ixora.	2.	30.

K.

Kyllinga	1.	20.

L.

Labatia	1.	32.
Laciſtema	1.	12.
Laetia	2.	83.
Lantana	2.	92.
Laugeria	2.	48.
Laurus	9.	65.
Lavenia	1.	112.
Leerſia	2.	21.
Leonotis	2.	84.
Lichen	18.	146.
Lightfootia.	1.	83.
Limodorum	2.	119.
Lindernia	1.	92.
Lippia	1.	92.
Liſianthus	4.	40.
Lithophila	1.	14.
Lobelia	1.	117.
Loranthus	3.	58.
Ludwigia	1.	33.
Lycopodium	4.	137.
Lythrum	2.	76.

M.

Magnolia	1.	87.
Malaxis	2.	119.
Malpighia	5.	74.

INDEX.

Manettia 1. 37.
Manisuris 1. 25.
Marattia 1. 128.
Marchantia 1. 145.
Marila 1. 84.
Matricaria 1. 114.
Melampodium 1. 114.
Melastoma 36. 68.
Melia 1. 67.
Melochia 3. 97.
Microtea 1. 53.
Milium 4. 24.
Mimosa 6. 85.
Mnium 3. 139.
Myginda 2. 39.
Myristica 2. 96.
Myrodia 2. 102.
Myrtus 16. 77.

O.

Ochna 1. 67.
Ochroma 1. 97.
Olyra 1. 21.
Omphalea 2. 95.
Orchis 1. 118.
Osmunda 4. 127.

O.

Panax 1. 54.
Panicum 19. 22.
Paspalum 4. 21.
Passiflora. 3. 97.
Paulinia 2. 64.
Pectis 1. 114.
Petaloma 2. 73.
Peziza 2. 150.
Phlomis 1. 88.
Phyllantha 3. 27.
Picramnia 1. 27.
Pinus. 1. 103.
Piper 17. 15.
Pisonia 2. 60.
Poa 2. 26.
Polypodium 31. 130.
Polytrichum 1. 139.
Pontederia 2. 57.
Portlandia 1. 48.
Posfira 2. 81.
Pothos 2. 38.
Prinos 2. 58.
Prunus 2. 80.
Psidium 2. 77.
Psychotria 23. 42.
Pteris 3. 129.

Q.

Quassia 1. 67.

R.

Rayania 2. 59.
Rhamnus 2. 50.
Rhexia 2. 61.
Riccia 1. 146.
Robinia 1. 106.
Rochefortia 2. 53.
Rolandra 1. 116.

Ron-

Rondeletia 8. 41.
Ruellia 3. 93.
Ruyschia 2. 50.

S.

Sabicea 2. 46.
Sacharum 1. 21.
Salvia 2. 14.
Samara 1. 32.
Samyda 4. 68.
Satyrium 5. 118.
Schæfferia 2. 38.
Schœnus 10. 19.
Scleria 6. 18.
Scutellaria 1. 89.
Securidaca 1. 104.
Serapias 2. 119.
Sicyos 1. 116.
Sida 4. 101.
Sisyrinchium 1. 17.
Sloanea 2. 82.
Smilax 1. 59.
Solandra 1. 42.
Solanum 3. 47.
Sonchus 1. 110.
Sophora 1. 66.
Spermaçoce 1. 29.
Spilanthus 1. 110.
Stachys 1. 88.
Staphylea 1. 55.
Sterculia 1. 98.
Stylosanthes 2. 108.
Styrax 1. 74.
Symplocos 1. 109.

T.

Tabernæmontana 1. 52.
Tamonea 2. 94.
Tanacium 2. 91.
Teramnus 2. 105.
Terminalia 2. 68.
Ternströmia 3. 81.
Tetranthus 1. 115.
Teucrium 1. 88.
Thouinia 1. 14.
Thrinax 1. 57.
Thymus 1. 89.
Tillandsia 5. 56.
Tournefortia 1. 40.
Tradescantia 5. 57.
Trichilia 3. 67.
Trichomanes 14. 136.
Triopteris 2. 75.
Triumfetta 2. 76.
Trixis 3. 115.
Tussilago 2. 113.

U.

Ulva 1. 148.
Urtica 22. 35.
Utricularia 1. 14.
Uvaria 1. 87.

V.

Vaccinium 1. 62.
Valentinia 1. 63.
Varronia 1. 48.

Ver-

Verbesina	1.	114.
Viburnum	1.	54.
Viola	1.	117.
Viscum	1.	32.
Vitex	2.	59.

W.

Wallenia	1.	31.
Weinmannia	1.	63.

X.

Xiphidium	1.	17.
Xylophylla	4.	28.

HOLMIÆ,

Typis And. Jac. Nordström.

MDCCLXXXVIII.